

superiorem dentatis, rhachi setulosâ aut inermi, sessilia, auriculis deorsum dirigentibus amplexicaulia, ramorum ovato-lanceolata, auriculis magnis ramos amplectentia, integra; Ramuli 2 — 3-flori, floribus coeruleis breviter pedicellatis; Achenia utrinque quinque-striata, superne puberula, griseo-nigrescentia, rostro albo paullulum breviora. Sieht einer *L. Scariola* L. ausserordentlich ähnlich, und unterscheidet sich nur durch blaue Blüten und durch auf der Mittelrippe nicht borstig-stachelige Blätter. Aus der Krim von Rögner erhalten. Auf dem Nordabhange des pontischen Gebirges auf Augitporphyr, bis 1000' Höhe.

77. *L. sagittata* W. et K. pl. rar. Hung. I. t. 1. *L. altissima* C. Koch in Linn. XVII. p. 267. nec Bieb. Im Banat in der Nähe der Herkulesquellen auf Jurakalk; auf dem pontischen Hochgebirge auf Urgestein und Porphyr, 5600—7000' hoch; im armenischen Gaue Daratschitschak auf basaltisch-trachytischem Boden, c. 5000' hoch.

78. *L. saligna* L. cod. No. 5821. Aus Grusien von Wilhelms und K. Schmidt erhalten.

79. *L. tephrocarpa* C. Koch; Pluricaulis, glaberrima; Caules pedales, vix ultra, erecti aut adscendentes, superne corymboso-paniculati; Folia radicalia et caulina inferiora cuneata quidem, sed apiculo instructa, margine dentibus parvis sed auriculis maximis saepe dentatis amplexicaulia; Ramuli foliis minutis dense vestiti, uniflori; Anthodium cylindricum, imbricatum; Achenia pallide cinerea, utrinque 10-striata, superne puberula, rostro vix breviora. Aehnelt der *L. sativa* L. *γ. crispa* DC. am Meisten, unterscheidet sich aber von ihr, so wie von *L. virosa* L. durch die hellaschenfarbigen Achenien. In Grusien.

80. *L. caucasica* C. Koch in Linn. XVII. p. 275.