

Hab. in subsalsis apricis montium calcareorum et schistosorum ad fl. Tscharysch, ad ostia fl. Kerlyk et Kan. ‡ Fl. Majo, Junio.

Explic. Icon. CXXVIII. — a) Bractea ex inferiori spicae parte m. n. b) Bractea ex intermedia spicae parte m. n. c) Bractea e superiori spicae parte m. n. d) Flos integer m. n. e) Calyx a latere adspectus m. n. f) Idem a parte anteriori visus cum stylo m. n. g) Idem longitudinaliter fissus, ut pistillum totum appareat m. n.

LACTUCA UNDULATA. Tab. CXXIX.

L. annua glauca, foliis radicalibus obovatis lyratisve; floralibus integris caulinisque pinnatifidis undulatis: laciniis inferiorum oblongo-ovatis angulato-denticulatis; superiorum oblongo-lanceolatis subintegerrimis, floribus corymboso-paniculatis.

Hab. in montibus Arkaul et Dolen-kara. ☉ Fl. Majo.

Explic. Icon. CXXIX. — a) Anthodium cum receptaculo, cui achenia tria insident m. n.

FRITILLARIA MINOR. Tab. CXXX.

F. caule subunifloro, foliis alternis linearibus canaliculatis, flore subtessellato, petalis interioribus latioribus obovatis.

Hab. in pratensibus inter pagos Wydricha et Schamanaicha, ad fl. Kurtschum, prope Salair. ♀ Fl. Aprili, Majo.

Explic. Icon. CXXX. — a) Petalum seriei exterioris, situ naturali, apice deorsum verso m. n. b) Petalum seriei interioris, situ naturali, apice deorsum verso m. n. c) Stamen m. n. d) Pistillum m. n. e) Germen sectione transversali m. n. f) Capsula matura m. n.

LONICERA PALLASII. Tab. CXXXI.

* * *Xylostea. α. Baccis coadunatis. † †. Caule erecto.*

L. Pallasii Ledeb. Ind. sem. h. Dorpat. appendix I. p. a. 1821. p. 20.

L. foliis ellipticis utrinque pilosis, ramulis junioribus hirsutis, filamentis longitudine corollae, baccis subglobosis.

Hab. in subalpinis montium altaicorum. ‡ Fl. Majo, Junio.

Explic. Icon. CXXXI. — Ramus florifer. a) Flores duo, germinibus coadunatis insidentes, bracteis stipati. b) Ramulus fructibus et foliis adultis praeditus. c) Fructus singulus e baccis duabus coadunatis formatus. d) Idem sectione transversali.

LEONTODON LEUCANTHUS. Tab. CXXXII.

L. squamis anthodii glabris; exterioribus adpressis ovatis acuminatis inappendiculatis planis, foliis lineari-vel subspathulato-oblongis integerrimis dentatisve.

Hab. in humidiusculis ad fl. Tschuja, inter fl. Kan et Jebagan in fl. Tscharysch influentes. ♀ Fl. Majo, Junio.

Explic. Icon. CXXXII. Planta integra m. n.



Lactuca undulata.