

- apricis Hispaniæ (Willd.), ad Malagam (Boiss.), Barcellonam (Req. Guss.), in Agro Ruscinonensi ad Olette et Villefranche (DC.) et circè Narbonam ad S. Paul de Fenoullbedes (Pourr.). Willd. sp. 3. p. 1529. DC. fl. fr. n. 2891. L. perennis γ. Lam. dict. 3. p. 409. Capitula minora quam L. perennis. Variat in locis montanis glabra, in calidis tota hispida, obs. cl. E. Boissier. (v. s. et v.)
12. L. SEGUSIANA (Balb. elench. fl. taur. 94. misc. p. 37. t. 8), glabra, caule erecto ramosissimo, foliis inferioribus attenuatis sessilibus, superioribus linearibus sagittatis, ramis 1-cephalis bracteolatis, invol. squamis linearibus, achæno lœvi rostro æquali. (2)? in collibus et vineis Pedemontii propè Segusium detex. cl. Balbis. Willd. sp. 3. p. 1529. DC. fl. fr. n. 2892. Achænia fusca, interdùm chermesina. Species L. tenerimæ valde affinis. (v. s.)
13. L. UNDULATA (Ledeb. fl. alt. 4. p. 156. ill. 2. t. 129), glabra glauca, caule simplici, foliis radicalibus obovatis lyratisve, floralibus integris, caulinis pin-natifidis undulatis, lobis inferiorum oblongo-lanceolatis subintegerrimis, capitulis corymboso-paniculatis, achæniis rostro quadruplo et ultrà brevioribus. (1) in Sibiria Altaica montibus Arkaul et Dolen-Kara (Meyer), in glareosis ad torrentem Lavin prov. Aderbeischan (Szow.). Herba 6-10 poll. (v. s. commun. à cl. Fisch.)
- L. dentata*, minor, foliis dentatis. (1) ad radices montis Sinai loco Bestan dicto legit cl. Schimper pl. exs. n. 128! (v. s.)
14. L. DISSECTA (Dou prod. fl. nep. 164), caule erecto piloso ramoso, foliis interruptè bipinnatifidis pilosiusculis, lobis rhomboides dentatis, petiolis amplexicaulibus basi sagittatis, paniculâ corymbosâ diffusa, pedicellis nudiusculis, achæno punctato rostro breviore. (1) in Nepaliâ. Flores cœrulei.
15. L. FISCHERTIANA, glabra, caulibus è collo plurimis erectis paucifoliis, foliis radicalibus linearibus integerrimis, caulinis linear-lanceolatis amplexicaulibus subdentatis, paniculâ corymbosâ, invol. adpressè calyculato flosculis dimidiò breviore. (2)? in Sibiria. Prenanthes graminea Fisch. mem. soc. nat. mosc. 3. p. 67. Cor. purpureæ. Flores in invol. 15. Achænia sulcata oblonga rotata. Ex his caract. potius Lactucæ quam Prenanthi adnumeranda sed mihi ignota.
- §. 2. Xanthinæ, nempe floribus constanter flavis.
16. L. GLABRA (DC. in Wight contr. p. 26), glabra, caule nudo dichotomè ramoso foliis æquali aut paulò longiore, foliis elongato-linearibus rigidulis acutis nunc integerrimis, nunc rigidulis ciliato-serratis, capitulis corymbosis longe-pedicellatis cylindraceis circ. 7-8-floris, involucro squamellis lanceolatis calyculato, squamis 5-6 linear-lanceolatis margine subscariosis calyculo triplo longioribus, achæniis in rostrum brevè productis. (2) in Indiâ orient. ad Neelgerry, Kaledguy. Prenanthes glabra Heyn. in Wall. cat. comp. n. 374. Denticuli foliorum subnulli aut saepius retrorsi. Folia 2-3 poll. longa, 2 lin. lata. (v. s. comm ab hon. coet. merc. angl. Ind. or.)
17. L. RIGIDA, glabra, caule gracili subangulato, foliis latè-linearibus sessilibus integerrimis rigidulis uniuersiis, paniculâ laxâ, pedicellis elongatis bracteolatis, capitulis cylindraceis 8-floris, invol. squamis 5 marginè scariosis constante-bracteolis triplo brevioribus calyculato, achæniis breviter rostratis. — in Indiâ orient. ad Bayisi seu Baysi legit cl. Hamilton. Prenanthes rigida Ham. in Wall. cat. comp. n. 373. (v. s. specim. imperf. in h. hon. coet. merc. Ind. or.)
18. L. LONGIFOLIA (DC. non Lam. nec Michx.), glabra, caule tereti erecto apice-laxè paniculato-corymboso, foliis linear-lanceolatis elongatis acuminatis integerrimis sessilibus hastato-auriculatis, auriculis acuminatis, pedicellis bracteolatis, capitulis 17-20-floris, invol. squamis exter. lanceolatis, int. linearibus duplo triplo longioribus, rostro achæniis ferè longitudinem æquante. (2) in Nepaliâ, Kamaon et ad Sinaghur legit cl. Wallich. Chondrilla longifolia