

1086. *Aster ursinus* Lévl., nov. spec.

Insigniter notatus indumento hirte et densissime griseo-villoso; folia lanceolata vel linearia dentata; bracteae involucrales dense hirtae; ligulae estriatae ad medium dilatatae, flosculis duplo longiores.

Corea: Quelpaert s. in humidis, 1 oct. 1911 (Taquet, 5675).

1087. *Lactuca (Prenanthes) Vaniotii* Lévl., nov. spec.

Planta robustissima elatissima, glabrata; folia runcinata nervosa, spinescentiformia lobis ovatis vel lanceolatis, incisis, dentatis, supra atro-viridia subtus glaucescentia; flores dense et elongate racemosi, racemis nudis, numerosis, stricte et appresse erectis: capitula parva; akoenia nigra, papillosa; pappus albus.

Corea: Quelpaert, in sepiibus, aug. 1911 (Taquet, 5720).

1088. *Lactuca Hallaisanensis* Lévl., nov. spec.

Radice fibrosa, stipite multicauli; planta glabrata glaucescente; folia heteromorpha nunc lanceolata nunc insigniter obovata vel ovato-rotundata obtusa vel mucronata; capitula mediocria ramulos gracillimos terminantes; pedunculis capillaribus; akoenia striata cylindrica; pappus niveus.

Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan, 800 m, jul. 1908 (Taquet, 1041).

1089. *Crepis Charbonnelii* Lévl., nov. spec.

Planta lactescens, glabra; folia basilaria non autem radicalia conferta taraxaciformia lobis et dentibus insigniter refractis; caules albidi; folia caulinaria, raro integra mucronata; pedunculi floriferi divaricati; capitula sat magna; bracteae involucrales pappum niveum superantes; akoenia cylindrica apice discoidea.

Tché-Ly: Ting-Tchéou, terres basses, mai 1909 (L. Chanet, 408).

1090. *Lactuca (Prenanthes) Blinii* Lévl., nov. spec.

Caules 50—70 cm alti, nudi, apice praesertim setosi; folia inferiora composita, longissime petiolata 3-foliolata; foliolis distinctis; subtus pallida foliolo terminali majore, angulato, acuto, dilatato, basi truncato, nervis conspicuis decompositis; folia superiora lyrata vel pandurata; capitula axillaria aggregata vel apice caulis racemosa; mediocria; akoenia brevia conica brunnea; pappus sordidus.

Corea: Quelpaert, S. O. Hoatien, aug. 1911 (Taquet, 5718).

1091. *Arabis Charbonnelii* Lévl., nov. spec.

Radice perpendiculari incrassata; caules erecti, virgati, foliosi, glabri; folia heteromorpha lyrata vel runcinata, vel tantum basi grosse dentata glabra semper longe petiolata, angustissime lanceolata; flores minimi terminales; siliquae gracillimae 4 cm longe pedicellatae arcuatae.

Frontière du Chan-Si et du Tche-Ly, à 6 kilom. de la Grande Muraille, 15 juin 1908, R. (L. Chanet, 223).

1092. *Cardamine impatiens* L. var. *Fumaria* Lévl., nov. var.

Planta glaberrima paleacea multicaulis; erecta caespitosa; folia inferiora *Fumariae*; superiora autem typi.

Corea: Quelpaert, S. in agris Syekeni, 15 apr. 1912, rara (Taquet, 6052).