

SECTION II. — **Mycalis** DC. *Prodr.*, 7, p. 139 (*emend.*). — Achaines petits, d'un brun rougeâtre, plurinerviés, à stries lamelliformes rugueuses-denticulées, atténués en un bec court, brun inférieurement, blanc vers le haut, terminé par un disque cupuliforme muni de cils persistants; péricline étroitement cylindrique, formé de 3-5 (ord<sup>e</sup> 5) folioles égales, obtuses, munies à leur base de petites écailles simulant un calicule.

3. — **L. MURALIS** E. Mey. *Chlor. Hannov.*, p. 431; G. et G. *Fl. Fr.*, 2, p. 321; *Prenanthes muralis* L. *Spec.*, 1121; *Chondrilla muralis* Lamk. *Dict.*, 2, p. 78; *Mycalis angulosa* Cass. *Dict.*, 33, p. 484; *M. muralis* Reichb. *Fl. exc.*, p. 272, *Icon. Germ.*, 19, t. 66; *Cicerbita muralis* Wallr. *Sched. crit.*, p. 436; *Phænixopus muralis* Koch *Syn.*, ed. 1, p. 430. — Exsicc. : Bill., 407; Orph. *Fl. Græca*, 767; Schultz Bip. *Chic.*, 119; Soc. *Dauph.*, 4945. — Tige de 4-10 décim., grêle, dressée, glabre, rameuse vers le haut. Feuilles molles, glauques en dessous, lyrées-pinnatiséquées, à segments anguleux, dentés, le terminal plus grand; les inférieures atténuées en pétiole; les caulinaires à rachis élargi, à lobes réduits à quelques dents et à pétiole auriculé. Calathides pédicellées, petites, pauciflores, en large panicule lâche terminale. Corolles jaunes. Achaines à aigrette blanche 2-3 fois plus longue qu'eux. ①. — Juillet-août.

HAB. — Bois, murs, haies, dans toute la France; Corse.

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. bor.); Asie-Mineure, rég. pontique, Caucase; Algérie.

SECTION III. — **Phænixopus** (Cass.) Willk. *Prodr. fl. Hisp.*, 2, p. 236. — Achaines fusiformes, longuement atténués en un bec grêle, de même couleur qu'eux, égalant au moins le 1/3 de leur longueur, et dépourvu de disque; péricline cylindrique, à folioles lâchement imbriquées; feuilles décurrentes.

4. — **L. VIMINEA** Presl *Fl. Cech.* (1819), p. 160; Link *Enum. h. Berol.*, 2 (1822), p. 281 et auct. (*excl. syn. Linn.*); *Chondrilla sessiliflora* Lamk. *Fl. fr.*, 2, p. 104; *C. viminea* Lamk. *Dict.*, 2, p. 77; *Phænixopus decurrens* Cass. *Dict.*, 39, p. 391; *P. vimineus* Reichb. *Fl. exc.*, p. 272; *Phænopus vimineus* DC. *Prodr.*, 7, p. 176. — Plante bisannuelle. Tige rameuse, à rameaux blanchâtres. Feuilles radicales  $\pm$  pinnatifides, souvent grandes, pinnatifides ou les caulinaires ord<sup>e</sup> entières. Calathides axillaires et terminales, solitaires ou par 2-3, nombreuses, médiocres, subsessiles. Corolles d'un jaune pâle, ord<sup>e</sup> rougeâtres ou violacées en dessous. Achaines noirs, à bec presque aussi long qu'eux.

$\alpha$ . *virgata* Nob. ; *L. viminea* Bor. *Fl. centre*, éd. 2, p. 312; G. et G. *Fl. fr.*, 2, p. 318; Willk. et Lge. *Prodr. fl. Hisp.*, 2, p. 236; Reichb., *l. c.*, 19, t. 67, f. 1; Car. S<sup>t</sup>-Lag. *Et. fl.*, p. 494. — Ces. Pass. Gib. *Ital. bor.*, 294; *Soc. Dauph.*, 1281 et bis; Baenitz *Herb. Europ.*, ann. 1877 (*Bohême*). — Corolles rougeâtres en dessous, à partie saillante égalant du 1/3 à la 1/2 de la longueur du péricline; rameaux allongés, distants, simples ou à peine rameux; partie décurrenente des feuilles d'un vert pâle, longue (1-3 cent.) allant souvent d'un entre-nœud à l'autre; plante de 3-7 décim.

$\beta$ . *Allionii* Nob. ; *Prenanthes ramosissima* All. *Fl. Ped.*, 1, p. 226, t. 33, f. 1; Mutel *Fl. fr.*, 2, p. 208. — Corolles à partie saillante égalant presque la longueur du péricline; rameaux plus nombreux que dans  $\alpha$ . et plus courts, peu étalés, simples; partie décurrenente des feuilles moyennes plus courte que dans  $\alpha$ ., mais bien moins que dans  $\gamma$ ., occupant ord<sup>t</sup> plus de la moitié de l'entre-nœud; plante peu élevée.

$\gamma$ . *Grenieri* Nob. ; *L. ramosissima* Gren. et Godr. *Fl. Fr.*, 2 (1850), p. 318 (*excl. syn. All.*); Reichb., *l. c.*, t. 68, f. 1, non Bor. ; *L. Grenieri* Loret *Etude Prodr. Lamt.*, p. 17; *Prenanthes ramosissima* Lois. *Fl. Gall.*, éd. 2, v. 2, p. 184. — *Soc. Dauph.*, 5425. — Corolles à partie saillante égalant environ la longueur du péricline; rameaux très rapprochés, courts, subspinescents, divariqués, rameux, en buisson; tige rameuse dès la base; partie décurrenente des feuilles très courte (5-8 mill. de long), épaisse, large, d'un vert noirâtre; plante peu élevée.

$\delta$ . *latifolia* Vayr. *Pl. not. Catal.*, p. 99. — Feuilles caulinaires elliptiques-lancéolées, pinnatifides ou roncinnées, les supérieures dentées.

HAB. — Haies du midi et du sud-est, jusqu'à l'*Ain* et la *Savoie*; var.  $\beta$ . : **Alpes-Maritimes** : sables maritimes à Nice (*Allioni*); à Sainte-Hélène (*Reuter*), à Menton, au cap Martin (*Ardoino*); **Var** : Toulon (*Robert*); **Bouches-du-Rhône** : Martigues (*Autheman*); **Corse** : Corté et route de Vivario (*Revelière*); var.  $\gamma$ . : **Alpes-Maritimes**, **Var**, **Bouches-du-Rhône**, **Gard**, **Hérault**, **Aude**; var.  $\delta$ . : **Pyrénées-Orientales** : Prats-de-Mollo (*Vayreda*).

AIRE GÉOGR. — *Europe centr. et méridid.*; *Caucase*, *Kurdistan*, *Asie-Mineure*, *Syrie*; *Arabie*, *Tunisie*, *Algérie*, *Maroc*.

Forme. — **L. chondrilliflora** Bor. *Fl. centre*, éd. 2, p. 312; G. et G. *Fl. Fr.*, 2, p. 318; Reichb., *l. c.*, 19, t. 67, f. 2; *L. Bauhini* Loret, *l. c.*, p. 17; *L. ramosissima* Bor. *Notes*, 1846, non G. et G.; *L. viminea* var. *chondrillæflora* Car.