

Trib. 2. PHYTEUMÆ.

Corolla profundè 5 partita. Antheræ distinctæ.

PHYTEUMA. *Lin.*

- 647 spicatum, L. ②. 5—7. In sylvis umbrosis!
 648 nigrum, Schm. ②. 5—7. In sylvis umbrosis!
 649 orbiculare, L. ②. 5—7. In pratis Eifliæ!
 β. involucatum.
 γ. minus.

Trib. 3. JASIONEÆ.

Corolla profundè 5. partita. Antheræ connatæ.

JASIONE. *Lin.*

- 650 montana, L. ②. 6—9. Pascuis siccis!
 651 glabrata = perennis, Lej. nec Lamk. ②. 6, 7. In Eifliæ.
 (D.a Lib!)

Fam. 46 LOBELIACEÆ. *Juss.*LOBELIA. *Lin.*

- 562 urens, L. ②. 6—9. In turfosis sabulosis Flandriæ (Hoor!)
 553 Dortmanna, L. ②. 6—8. In stagnis arenosis Campiniæ.

Fam. 47 SYNANTHEREÆ. *Cass.*Series 1^a TRICHOSTYLEÆ.

Stylus et stigmata dorso pilosa.

Trib. 1. LACTUCEÆ. *Adans. Cass.*Sbtrib. 1. LACTUCÆ ARCHETYPEÆ. *Cass.*SONCHUS. *Lin. Cass.*

- 654 palustris, L. ②. 7, 8. In pratis humidis!