

5. *Lactucopsis* (*Lactuca* L. — DC. pr. VII, p. 138, et *L. stricta* W. K. — DC. l. c.) *quercina* Sz. Bip. foliis acute sagittatis, pinnisque lanceolatis, lacero-dentatis a sequente differt.

(Vidi specim. spont. e ditione florae halens. Sprgl! fl. hal., p. 225, et Syst. veg. III, 660; pr. Rossleben: Wallr! sched. crit., p. 435, nom. *Cicerbitae corymbosae*; Hercynia: Hampe; ! Hungaria pr. Budam: Lang!; Moravia pr. Brünn: Makosky!; Serbia: Pančić!).

** *Achaenia brunnea*, pappus basi margine ciliato persistente cinctus. Huc

6. *Lactucopsis* (*Lactuca* Boiss. Kotschy! it. cilicico-kurdicum 1859) *mulgedioides* Sz. Bip. Capitula 18-flora, *L. quercinae* majora, folia latiora, amplexicauli-auriculata, runcinato-pinnatifida.

β. Caulis cum foliorum pagina aversa pubescens, flores aureo-vitellini, *achae-
nia brunnea*. Hujus loci

7. *Lactucopsis aurea*. C. H. Schultz Bipont. MS. *Mulgedium* (Sectio *Chryso-
mulgedium*) *aureum* Sz. Bip. in litt. ad cl. Pančić. *Lactuca sonchifolia*
Panč. *Verz. der in Serbien wildw. Phanerog.*, p. 85, non Willd.

Herba perennis pluripedalis, caule erecto, tereti, inferne pubescente, pen-
nam anserinam crasso, superne glabro, medulla farcto, racemoso-paniculato,
racemo elongato angusto pedali; foliis alternis, fere spithameis, 3 poll.
latis, infra ad costam et nervos pubescentibus, lyratis, lobo terminali maxi-
mo, deltoideo, lateralibus 3-jugis, ovato-oblongis, acutis, eroso-dentatis, su-
perne decrescentibus et tandem in bracteas parvas lanceolatas, integras acu-
tas, more *Lactucae auriculatas*, ad exortum ramulorum transeuntibus. *Ra-
muli* breves 1-3-cephali. *Capitula* speciosa, 18-flora. *Involucrum* ovato-cylin-
draceum, $\frac{1}{2}$ poll. altum, imbricatum, glabrum, virens, foliolis numerosis,
obtusis, externis variae magnitudinis, internis n.º 13 subaequalibus, post
achaeiorum maturitatem reflexis. *Receptaculum* nudum, convexum, $\frac{5}{4}$ lin.
diametro metiens. Flores $\frac{1}{2}$ poll. longi, intense aurei, ad os pilosi. *Achaenia*
obscure cinereo-brunnea, 3 lin. fere longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, ovato-lanceolata,
utrinque attenuata, compressa, utrinque striis 10 percurta longitudinalibus,
marginata i. e. striis margine crassioribus, callo basilari parvo munita, gla-
bra, margine vero, praecipue rostrum breve concolor crassum versus, hispi-
dula, apice in discum expansa, cujus margini pappus insidet 2 lin. longus
niveus, denticulatus, caducus, *achaeiorum* vero sterilium, linearium, palli-
dorum persistens.