

langen Pappusborsten (*Cephalorrhynchus* Boiss.), Arten mit geschnäbelten zusammengedrückten Früchten mit ungleichlangen Pappusreihen (*Streptorhambus* Bge), solche mit ungeschnäbelten und ungleichlangen Pappusreihen ausgestatteten Früchten (*Cicerbita* Wallr. = *Mulgedium* Cass.), sowie Arten deren geschnäbelte Früchte gleichwertige Pappusborsten besitzen (*Lactuca* L. s. str.), aufgeteilt werden. Auch die *Phoenixopus*, welche in der Tschechoslowakei durch *Ph. vimineus* (L.) DC. vertreten ist, würde eine Abtrennung verdienen. Der Gattung *Lactuca* morphologisch sehr nahestehende *Sonchus* ist gut abgegrenzt. Er hat die Neigung in der inneren Pappusreihe dickere Borsten als in der äusseren auszubilden. Aber auch in diese Gattungsübersicht würde es uns nicht gelingen alle Arten der Gruppe einzureihen. So bleibt z. B. „*Lactuca*“ *sibirica* L. beiseite. Diese Art wird in den einzelnen Floras ebenso oft unter die Gattung *Mulgedium* wie *Lactuca* gestellt. Falls wir uns an die genannten Hauptmerkmale der Gattung halten, kann sie weder zu *Lactuca* noch zu *Mulgedium* gereiht werden, denn sie hat gleichlange Pappusreihen (wie *Lactuca*), aber ihre Früchte sind oben verschmälert, ohne ausgeprägten Schnabel (in der Form den Früchten von *Mulgedium* entsprechend). Deshalb trennte ich diese Art von ihnen und reihte sie zu einer neuen Gattung *Lagedium*. Ausser *L. sibiricum* kann hierher noch das verwandte *Lagedium tataricum* (L.) comb. nova (bas.: *Sonchus tataricus* Linné Mantissa plantarum 2: 572, 1771) gestellt werden.

### *Lagedium* gen. novum

Plantae herbaceae, radicibus tenuibus, non incrassatis; involucri phylla pluriseriata, externa inaequaliter imbricata; calathia mediocria, ± in paniculas disposita, multiflora, liguliflora, floribus omnibus fertilibus; flores hermafroditi, tubo corollae superne piloso; stylus strigosus, ramis papillois, tenuibus; antherae basi sat longe sagittatae; achenia elliptico-oblonga vel oblonga, pluricostata, a dorso compressa, apice angustata, fere erostrata vel paulatim attenuata et brevissime subrostrata, rostris achenii colore; pappus pluriserialis, disco ad apicem achenii sito insidens, setis aequilongis, aequaliter incrassatis, simplicibus, asperis, nunquam pappi setae extus ciliarum brevium serie cinctae.

A *Cicerbita* Wallr. (*Mulgedium* Cass.) setis pappi aequilongis sine ciliarum brevium serie, a generibus *Lactuca* L., *Streptorhambus* Bunge et *Cephalorrhynchus* Boiss. rostri perspicui longi absentia, a genere *Sonchus* setis pappi aequaliter incrassatis, a generibus *Mycelis* et *Ixeris* involucri imbricatis, achenis compressis, majoribus, differt. Typus generis: *Lagedium sibiricum* (L.) comb. nova (*Sonchus sibiricus* Linné Species plantarum 795, 1753).

### Bemerkungen zu einigen *Cirsium*- Arten

*Cirsium wwedenskyi* (Petra) comb. nova [*C. caucasicum* (Ad.) Petra var. *wwedenskyi* Petra Vistnik tiflisskogo botaničeskogo sada = Moniteur du Jardin Botanique de Tiflis 24, p. 4 (pag. ex separato), 1912] unterscheidet sich wesentlich von allen Formen des *C. caucasicum* durch folgende Merkmale: