

29. COMPOSÉES.

I. SÉMIFLOSCULEUSES. XVI. LAGOSÉRIDE.

dentées - runcinées, à bouts des lacinules mucronulés; glabriuscules; caulinaires en petit nombre, pinnatifides, intégrées. Panicule lache; bractéoles nulles. Corolles jaunes. Vivace?

Crepis intybacea. BROTERO. *Phytogr. Fasc. I. n. 11. lusit. I.*
p. 320.

NOM PORTUGAIS: systématique, **LAGOSERIS INTYBACEA**;
dans *Brotero*: Almeirão.

LIEU NATAL. Fréquente aux environs de *Lisbonne* dans les champs et le long des chemins. Aux environs de *Coimbre*, selon BROTERO.

FLORAISON. Mars, Avril.

2.

LAGOSÉRIDE CALYCINÉ.

Caractère.

Feuilles runcinées, mucronulées, un peu velues. Phylles extérieurs du peranthode égalant presque les intérieurs.

Diagnose.

Tige montante, rameuse, angulée, à poils courts, épars. Feuilles radicales rétrécies en pétiole, sinuées - dentées, runcinées, à bouts mucronulés; caulinaires sessiles, décroissantes. Panicule lache; bractéoles nulles. Peranthode hérissé; phylles intérieurs lancéolés-linéaires, extérieurs ovales. Corolles jaunes. Annuelle.

LAGOSERIS CALYCINA.

Character.

Foliis runcinatis mucronulatis hirsutiusculis, peranthodii phyllis exterioribus interiora subaequantibus.

Diagnosis.

Caulis adscendens, ramosus, angulatus, pilis brevibus, sparsis. Folia radicalia in petiolum angustata, sinuato-dentata, runcinata, apicibus mucronulatis; caulina sessilia, deliquescentia. Panicula laxa, bracteolis nullis. Peranthodium hirtum; phylla interiora lanceolato-linearia, exteriora ovalia. Corollae flavae. Annua.

NOM PORTUGAIS systématique: **LAGOSERIS CALYCINA.**

LIEU NATAL. Près de *Thomar*, sur les collines en dessus du canal.

FLORAISON. Juin, Juillet.

29. COMPOSITAE.

I. SEMIELOSCULOSAE. XVI. LAGOSERIS.

tato - runcinata, apicibus laciniarum mucronulatis, glabriusculis; caulina pauca, parva, pinnatifida, integrata. Panicula laxa, bracteolis nullis. Corollae flavae. Perennis?