

tereaque subtus setulosis obovato-oblongis obtusis in petiolum attenuatis integris remote dentatis vel subruncinato-lyratis laciniis lateralibus utrinque 1-2 dentiformibus, scapis monocephalis folia parum superantibus, capitulis conicis, involucri albo-farinosi phyllis acutis externis paucis inæqualibus brevibus internis planis nervo breviter nigro-setulosis, flosculis luteis, acheniis conformibus columnaribus albidis non attenuatis. pappo niveo involucrum paulo superante ♀. *Derouetia frigida* Diagn. Ser. II. 5, p. 114. — *D. robertoides* Boiss. in Bal. pl. exs. — *Intybellia glareosa* Schott et Ky. in Ky. exs.

Hab. in lapidosis mobilibus regionis alpinæ montis Masmeneudagh et montis Argæi Cappadociae 9000'-9800' (Bal!), Tauri Cilicici (Ky!).

β. *Bourgæi*. — Folia glabrescentia minus dentata, capitula submajora. — *D. Bourgæi* Boiss. MSS.

Folia cum petiolo 1-1 $\frac{1}{2}$ -pollicaria, scapi 1-2 pollicares, capitulum magn. *Robertiae*. Setæ receptaculi acheniis longiores; facies *Crepidis pygmaeæ*.

5. **L. purpurea** (Willd. Sp. III, p. 1560 sub *Hieracio*) rhizomate horizontali sæpe pluricipiti, foliis omnibus rosulatis carnosulis adpresso araneoso-canescensibus oblongo-lanceolatis in petiolum sensim attenuatis in laciniis breves acute dentato-laceras divergentes runcinato-pinnatifidis, scapis elatis erectis apice dichotomis 2-6-cephalisch corymbosis, capitulis mediocribus, involucri adpresso araneoso-canescens phyllis obtusis externis triangulari-lanceolatis triplo brevioribus intimis linearibus fractiferis dorso rotundatis, flosculis purpureo-cæruleis. acheniis conformibus rufis columnaribus striatis, pappo albo brevi involucrum vix superante ♀. *L. Taurica* et *L. crepoides* M.B. Suppl. et Cent. Pl. Ross. tab. 30. — *Crepis purpurea* M.B. Taur. Cauc. p. 255. — *Intybellia rosea* Cass. — *Int. purpurea* D.C. Prodr. VII, p. 180.

Hab. in saxosis cretaceis Tauriæ circa Karassubazar (Stev!).

6. **L. hieracioides** (Boiss. et Haussk.) glabra, caulis albidis elatis foliosis a medio vel inferius dichotome et subdivaricatum ramosis 2-4-cephalisch, foliis majusculis oblongo-lanceolatis obtusiusculis grosse pauci-dentatis inferioribus in petiolum attenuatis intermediis acutiuscule sagittato-auriculatis, capitulis longiuscule pedunculatis mediocribus, involucri canescens phyllis externis anguste linearibus brevibus internis fructiferis dorso convexis, acheniis conformibus columnaribus striatis superne subaugustioribus externis albidis, pappo albo brevi involucrum non superante ♀.

Hab. in rupibus calcareis montium Schahu et Pir Omar Gudrun Kurdistaniæ Persicæ 6000! (Haussk !)

Sesquipedalis, folia radicalia cum petiolo semipedalia sesquipollis lata, caulinæ inferiora 3-4-pollicaria, capitula tantum fructifera a me visa illis *L. purpureæ* submajora, receptaculi setæ achenia superantes, flosculi non noti.