

Bosnia. Ad viam ferream prope „Dobrun“ secus „Rrzava“. 386
m. s. m.

Julio 1907.

leg. **K. Maly.**

5129. *Taraxacum Hjeltii*

Dahlstedt, Arktiska och alpina arter inom formgruppen *Taraxacum*
ceratophorum (*Led.*) *D. C.*, in *Arkiv för Botanik*, Bd. 5, Nr. 9,
p. 6, tab. 1 et 2 (1906).

Rossia. Lapponia Fennica. „Enontekis“. In prato ad „Hetta“.

Julio 1907.

leg. **J. Montell.**

5130. *Hieracium valdepilosum*

Villars, Prospectus de l'histoire des plantes de Dauphiné, p. 34
(1779); — ex *Villars*, Histoire des plantes des Dauphiné, III.,
p. 106, tab. XXX (1789).

ssp. *subvaldepilosum*

H. Zahn, in *Hallier-Koch*, Synopsis der Deutschen und Schweizer
Flora, p. 1867 (1902).

Helvetia. „Les Morteys“. 2000—2200 m. s. m.

Augusto 1908.

leg. **F. Jaquet.**

5131. *Hieracium porrifolium*

Linné, Spec. plant. ed. I., p. 802 (1753).

Austria inferior. In saxosis vallis „Höllental“ prope „Payerbach“;
solo calc.

Augusto 1908.

leg. **K. Ronniger.**

5132. *Lagoseris sancta* (*L.*) *K. Maly.*

Hieracium sanctum *Linné*, Cent. pl., II., p. 30 (1756);
Amoen. acad., IV., p. 328 (1759); Spec. plant. ed. II., p. 1127 (1763).

— *Lagoseris sancta* *K. Maly*, in *Glasnik zem. muzeja u*
Bosni i Hercegovini, XX, str. 556 i 562 (1908).

Syn. *Trichocrepis bifida* *Visiani*, Stirp. dalm. spec., p. 19, tab. 7 (1826). — *Lagoseris bifida* *Koch*, Syn. I. p. 435 (1836). — *Pterotheca bifida* *Fisch et Mey.*, Ind. sem. hort. Petrop., IV., p. 43 u. 736 (1837).

[Obige Literaturangaben nach *K. Maly* in litt.]

Bosnia. In saltu inter flumen „Miljacka“ et fauces „Moščanica-Schlucht“ prope „Sarajevo“. Solo calc. 580 – 600 m. s. m.

Majo 1909. leg. **K. Maly.**

Die Gattung *Lagoseris* M. B. (Cent. plant. rar. Ross. merid., I., t. 30 [1810]) ist älter als *Pterotheca* Cass. (in Bull. Soc. Philomat. 1816, p. 200), doch ursprünglich nur auf die Abbildung begründet (Internat. Regeln der botan. Nomenklatur 1906, Art. 37 und 38). Erstere wurde von *Boissier* (*Flora orient.* III., p. 881 [1875], *Nyman* *Consp. fl. Europ.* p. 480 [1879]) u. *Post et O. Kuntze* (*Lexikon gen. Phanerog.* p. 314 [1903]) u. a. angenommen, von *Taubert* (in *Engler, Die natürl. Pflanzenfamilien*, 1894, S. 368) aber als Synonym zu *Pterotheca* gezogen. Nach den Internat. Regeln der Nomenklatur gebührt dem Namen *Lagoseris* der Vorzug.

Hieracium sanctum L. wurde auf Grund einer Pflanze aufgestellt, die *Hasselquist* in Palästina sammelte. Dasselbst kommt aber nur jene Pflanze vor, die vordem *L. bifida* genannt wurde und nicht die westeuropäische *L. nemausensis* (*Gou*)

K. Maly.

5133. *Phyteuma pedemontanum*

R. Schulz, Monographie der Gattung *Phyteuma*, p. 60 u. 163 (1904). Ad confines Galliae et Italiae. Tenda. „Val Fontanalba“. 2300—2500 m. s. m.


Julio et Augusto 1909.

leg. **Cl. Bicknell** et **L. Pollini.**

5134. *Pirola grandiflora*

Radius, Dissertatio de *Pyrola* et *Chimophila*, p. 27, tab. III., fg. 2 (1821).

Syn. *Pirola groenlandica* *Hornemann* in *Flora Danica*, tab. 1817 (1825).



Caulis huic cubitalis, glaber, vel ad originem foliorum solummodò pubescens, biflorus, triflorusve striato-angulatus. Folia glaberrima, modò dentata, modò pinnatifida, runcinataque. Folium in caule unicum, medium quasi inter folia radicalia ramumque infimum. Rami (seu pedunculi) duo, tresve, palmares, uniflori, nudi; sed singuli juxta sui longitudinem squamulas subulatas geminas gerunt, quarum alia circa pedunculi medium; altera paulò infra florem. Calyces magni, glabri, squamis ovatis carnosis virentibus, margine membranaceo exalbido.

SIBIRICA.

2. CREPIS, foliis oblongis amplexicaulibus dentatis, calycibus laxis, carinâ ciliatis. *Linn. Sp.* 1135. Hieracium montanum majus latifolium Genevense. *Baub. Hist.* 2. 1036. Bona. Hieracium montanum majus latifolium glabrum. *Baub. pin.* 129. Hieracium montanum majus latifolium. *Tabern. Ic.* 186. Bona etiam. *Chab. St. Ic.* 322. Hieracium magnum Hispanicum. *Park.*

Hieracium, sive Dens Leonis latifolius caulescens. *Baub. prod.* Hieracium pyrenaicum blattariæ folio minus hirsutum. *Herm. par. Tab.* 184. *Pluk. Tab.* CXVI. Fig. 1. Icon non malè summitatem ac foliorum hamos exprimit.

Hieracium caule ramoso, foliis infirmis, infimis petiolatis, reliquis ex ovato-lanceolatis; omnibus sinuosis petiolorum instar dentatis. *Gmel. Sib. Tab.* 10. Non mala.

Hieracium foliis amplexicaulibus ferratis glabris, hamis aristatis, calycibus villosis. *Hall. Edit.* 2. Num. 39. *Emend.* 11. Num. 99. *Cat. rar.* 975.

Hieracium (*pyrenaicum*) foliis amplexicaulibus obovato-lanceolatis, retrorsum dentatis, caule simplici, calycibus laxis. *Linn. Syst.* pag. 1195. cum varietate, quæ

Crepis (*austriaca*) foliis oblongis denticulatis, involucrio laxissimo, calycibus hispidis. *Jacq. vind.* 270. Certo.

NOTA. In pyrenæis ad montem *Laurenti* frequens, inter *Lilium pyrenaicum*; Aucem. *narcissifloram*, *alpinam*, infra stagnum.

Utrum varietas Hieracii (Num. 22.) seu *blattarioides* *Syst. nat.* pag. 523. β) huc pertineat, dubito. Minimè verò de varietate γ (seu *Picris pyrenaica*); alia enim est, ut jam ad *Picridem* dixi. Sed ultimam varietatem ϵ (*helveticum* *Syst. nat.* 1b.) etiam cum *Hallero* diversam statuo; videtur *Hieracii* amandanda quidem, ob pappum pilosum sessilem, atque habitum à *Picridibus* alienum.

NEMAUSENSIS.

3. CREPIS, scapo nudo hirto, floribus corymbosis, foliis lyratis runcinatis.

Hieracium Dentis Leonis folio monoclonon subasperum. *Baub. pin.* 127.

Hieracium intybaceum seu sextum. *Tabern. Ic.* 183. Non mala.

Hieracium Dentis Leonis folio monoclonon glabrum. *Baub. pin.* 127.? Caulem glabrum non vidi; sed summitas ramorum glabra est quandoque.

Hieracium (*sanctum*) scapo nudo multifloro, foliis lyratis. *Linn. Sp.* 1127. Ex ipso *Linneo*, in *Litteris*.

Nemausi ad vinearum & arborum sepem circa *Latourmagne* Anno 1763. cum *Clariff. Seguiero* collegimus.

Planta facie quasi media inter *hypocharides* & *Crepidem fetidam*. Radix crassa longa napiformis, ramo uno aut altero. Folia radicalia biuncialia triuncialiave, runcinata (facie *Barbarea*, *Lampfana* & *Crepididis tectorum*, quæ *Hier. fol.* & facie *chondrilla*. *Lob.* 239.) seu lyrata pinnulis utrinque 5-7. minoribus, obtusè triangulatis, sub-oppoſitis, utrinque scabris hirtis, quibus non rarò aliæ plures minimæ interponuntur; pinnula extima uncialis fermè, cordato-hastata, aut ovata, dentibus majoribus angulata pro more *Alliaria*, *Cacalia*, &c. Scapi aphylli, colorati, 1-6. ex eadem radice, palmares, pedales, imò cubitales, pilis patentibus hispidi, apice (ut plurimum) hirsutiores, ad terram primùm incurvati, dein erecti. Rami (seu pedunculi) pilosissimi, alterni, sibi tamen vicini, unciales, biuncialesve, uniflori, ex summo caule triente emergunt. Calyces exactè calyculati, instar *Crepididis pulchrae*; squamæ inferiores (seu exteriores) minimæ, ovatae, acutæ. Calyx interior è contra constat squamis æqualibus lanceolato-oblongis, acutis, glabris, margine membranaceis albescentibus. Flores lutei magnitudine *Crepididis fetidae*, *tectorum*. Semina varia; *marginalia* crassiora sunt, breviora, alata, incurva, marginibus paulò revolutis, nervo dorsali virente, singulaque squamulâ calycis involuta pro more *Calthæ*, *Rhagadioli*, *Hypoferidis*! Pappum his nullum observavi; *centralia* verò angusta, longiora, recta, pappo instructa piloso sessili.