

3466. *H. MURORUM*. *Limn. W. E.* 823. Fol. inferiora sublyrata petiolo elongato auriculato, caulina amplexicaulia basi sinuato-dentata. Hujus var. est *H. pallescens Waldst. W. E.* 803. quod Willdenowius in herbario jamjam combinavit. Et *H. ramosum Waldst. Kit. W. E.* 823. vix differt.
3467. *H. PALUDOSUM*. *Limn. W. E.* 824. Folia caulina basi attenuata at amplexicaulia.
3468. *H. LAMPSANOIDES*. *Gouan. W. Sp.* 3. 1580. Hab. in Europa australi 2. D. Petiolus foliorum alatus.

486. LAGOSERIS.

Flor. portug. 2. 140.

Pappo stipitato a *Crepide* differt. Non *Lagoseris* Marschall'i.

3469. *L. BURSIFOLIA*. *Crepis bursifolia Linn. W. Sp.* 3. 1592. Hab. in Sicilia 2. D. Cal. cylindrici ut in *Prenanthe*.
3470. *L. VERSICOLOR*. *Fischer*. Fol. longe lanceolatis acutis repandis glabris, floribus cylindricis, calyce exteriori minimo. Hab. in Dauria 2. D. Fol. radicalia in petiolum longum attenuata, caulina pauca sessilia. Calycis exterioris phylla ovata albo marginata 1" longa interiora 4" longa, lanceolata acuta obscure viridia.
3471. *L. CERNUA*. *Crepis cernua Tenore. Spreng pug.* 1. 53. Hab. in Calabria 2. D. Cal. minus cylindricus ac in pr. cui affinis. Semina parum in stipitem attenuata.
3472. *L. LEONTODONTOIDES*. *Crepis leontodontoides Allion. W. E.* 826. Cr. *nemausensis W. E. S.* 54. Fol. *Taraxaci*. Cal. phylla exteriora canaliculata, omnia hirta. Vera *Crepis nemausensis Gouan* habet pappum in disco stipitatum, hinc valde differt a *Lagoseri nemausensi* Marschalli, ad quam genus constituit vir cel.
3473. *L. RAPHANIFOLIA*. *Crepis raphanifolia W. E. S.* 55. c. *descr. Hornem. hafn.* 970. Fol. exacte lyrata.
3474. *L. TAURINENSIS*. *Crepis taurinensis W. E.* 827. *Crepis vesicaria Balb. taur.* 93. Fol. runcinata, laciniis superne dentatis.