

5. HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis imbricatis, caulo nudo, 10ijis dentato sinuatis. *Hort. cliff.* 386. *n. 4. Hort. upf.* 240. \* *Roy. Ingdb.* 126. *Dalib. paris.* 233. *Savv. monsp.* 300.  
*Hypochaeris chondrilla folio, parvo flore. Vaill. a. 7.*  
*1721. p. 214.*  
*Hieracium minus, dentis iconis folio oblongo glabro.*  
*Baub. pin. 127.*  
*Hyoseris altera. Tabern. bist. 490.*  
*Habitat in Dania, Germania, Belgio. ◎*
6. HYPOCHÆRIS folijs dentato-sinuatis scabris, caule radicata, ramoso nudo, pedunculis squamofisis. *Hort. cliff.* 386. *Roy. Ingdb.* 125. *Dalib. paris.* 239. *Is. scand.* 225. \* *Savv. monsp.* 299.  
*Hieracium, dentis iconis folio obtuso, majus. Baub.*  
*pin. 127. Moris. bist. 3. p. 66. f. 7. t. 4. f. 27.*  
*Hieracium longius radicatum. Lob. bist. 120. Raj. bist.*  
*230.*  
*Hieracium tertium. Dod. pempt. 639.*  
*Habitat in Europa cultioris pasturis.*

### LAPSANA.

1. LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Hort. cliff.* 384. *Fl. succ.* 649.  
*Roy. Ingdb.* 130. *Hort. upf.* 246. *Dalib. paris.* 244.  
*Gmel. fib. 2. p. 40.*  
*Lapsana. Dod. pempt. 675.*  
*Soncho affinis Lapsana domestica. Baub. pin. 124.*  
*Habitat in Europa cultis.*
2. LAPSANA calycibus fructus torulosis depresso-  
 tubis sessilibus. *Zolintha.*  
*Lapsana calycibus fructus subrotundis angulatis, pedunculis incrassatis, floribus erectis. Roy. Ingdb.* 131.  
*Hort. cliff.* 390.  
*Chondrilla verrucaria, foliis cichorei viridibus. Baub.*  
*pin. 130.*  
*Cichorium verrucatum, zacintha. Clus. bist. 2. p. 144.*  
*Habitat in Italia. ◎*  
*Toruli calycis fractiseri oculo, gibbi, profunde distincti nodis rufescientibus, exteriora vero calycis foliola tenera & mollia persisterunt.*
3. LAPSANA calycibus fructus unique patentibus ra-  
 diis subulatis, foliis lanceolatis indivisis. *Hort. upf.*  
*245. \* Savv. monsp.* 82. *Hie-*

823. LAPSANA \* *Lampsana Vaill. A. G.* 1721. 8.  
 47. 48. *Tournef.* 272. *Rhagadiolus Vaill. A.G.*  
 1721. t. 47. 37. 38. *Tournef.* 272. *Zacintha*  
*Vaill. A. G.* 1721. 48. 27. 33. 35. 36.  
*Tournef.* 269. .

CAL. *Communis* angustus, ovatus, angulatus: *Squamis* tubi octo,  
 æqualibus, linearibus, cavo-canaliculatis, carinatis, acutis;  
*S. basalis* sex, imbricatis, parvis, alternis, minimis.

COR. *Composita* imbricata, uniformis: *Corollulis* hermaproditis cir-  
 citer sedecim, æqualibus.

*Propria* monopetala, ligulata, truncata, quinquedentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cy-  
 lindracea, tubulata.

PIST. *Germes* infra corollam propriam. *Styles* filiformis, lon-  
 gitudine filamentum. *Stigma* bifidum, reflexum.

PER. nullum. *Calycis squamae* tubi semina proxima amplectun-  
 tur.

SEM. solitaria, oblonga, cylindraceo-trigona.

REC. nudum, planum.

OBS. *Lampsana* T. V. Semina omnia nuda, *calycis squama* ver-  
 nalla evoluta.

*Rhagadioli* T. V. Semina singula *singula calycis squama* inver-  
 lata.

*Zacinthe* T. V. Semina marginalia *singula calycis squama* in-  
 voluta.

*centralia coronata populo brevi, simplici.*