

LAMPSANA ADENOPHORA Boiss.

L. annua a basi tota pilis brevibus densis patulis glandulosis obsita, foliis radicalibus inferioribusque interrupte lyratis lobis repando-dentatis, caulinis superioribus lanceolato-linearibus integris, inflorescentiâ compositâ paniculato-corymbosâ, ramis dichotomo-divaricatis, pedicellis involucro sublongioribus, involucri basi breviter calyculati squamis linearis-lanceolatis obtusis secûs lineam medium piloso-glandulosis, floribus croceis involucro duplò longioribus.

L. grandiflora var. *g.* DC. Prodr.

Hab. in umbrosis *Tmoli* suprà Philadelphiam, *Olympi Bithyni* Aucher N° 3365.

Pulchra species a *L. communi* indumento florumque magnitudine distinctissima. *L. grandiflora* et *intermedia* MB. quas pro unâ et eâdem specie habeo, a meâ plantâ facile distinguntur radice perenni, indumento vel nullo vel in plantæ parte superiori parcissimo, foliis caulinis superioribus oblongis dentatis, inflorescentiâ simpliciori corymbosâ, capitulis dimidiò majoribus, floribus pallidè flavis. Folia radicalia ferè *Crepidis interruptæ*. Culturâ non mutatur.

TRAGOPOGON LATIFOLIUM Boiss.

T. bienne, radice tenui elongatâ, caule erecto elato infernè parcè tomentoso supernè glabro folioso simplici rarius parcissimè ramoso, foliis supernè glabriusculis infernè breviter et adpressè hirsutis latè ovato-oblongis abrupte et longè attenuato-acuminatis basi subamplexicaulibus 8-12 nerviis margine integris subundulatis superioribus minoribus lanceolatis, pedunculis longis fistulosis apice vix incrassatis, involuci sub 12 phylli foliolis glabrescentibus lanceolatis longè acuminatis, flosculis marginalibus involucro longioribus, achæniis marginalibus glabris in rostrum eis dimidiò breviùs attenuatis squamato-muricatis.

Hab. inter segetes *Cariæ*, legi florif. et fructif. Junio 1842 in planicie ad meridiem *Cadmi* sitâ, Chr. Pinard in *Cariâ* interiori æst. 1843.