

canum × *palustre*) Schur bei Sz. György (17). — *C. brachycephalum* Jur. var. *lactiflorum* Sabr. *ibid.*; die typische Form bei Halas (Borb. 1886) und auf dem Schwabenberge bei Budapest (Borb. et Perlaky 1892, selten!).

Lapsana cancellata Borb. Földmívelési Erdekeink 1881, p. 276 foliis radicalibus et caulinis inferioribus 2—5-jugo lyrato-runcinatis, supra subtusque pubescentibus; caule fere a medio dichotome atque divaricatim corymboso-fastigiato, glaberrimo nitido (aut glanduloso-hispido), axe flexuoso cum ramis divaricato-patentissimis, saepe dichotomiam et quasi cancellos simulantibus. Flores aurei, maiores et magis intense flavi ac in *L. communi*. Am Fusse des Allionberges bei Orsova häufig; var. *adenocladus* Borb. *ibid.*, ramis, pedunculis et capitulo nigrescenti-glanduliferis.¹⁾ — *Crepis setosa* Hall. fil. var. *glabrata* Porc., Petrozsény (Borb. 1871). — *Taraxacum leptcephalum* Rehb. Stadtwäldchen, Rákos bei Budapest, Monor (Borb. 1886). — *Hieracium Tatrae* Gris. Zaskov (10). — *H. ramosum* W. Kit. Barlangliget, Tatra-Füred, unterhalb dem Felkaer Thal, Tatra-Széplak, Csorbaer See, Gyömbér, bis 1000—1400 m., Blatnitza (Borb. 1890—1892), Lucski, Liptóujvár (8).

**H. subsinuatum* Borb. in 4. (ex *Alpestribus* Fr.) ramis divaricatis, foliis grosse aut subsinuato-dentatis, caulinis basi dilatatis, bei dem Csorbaer See, auch floribus tubulosis! (Borb. 1890, 1892.)

Campanula pusilla Haenke, Zaskov. (10).

Galium Anglicum Huds. auf trockenem Waldboden bei Kéthely cott. Somogy (4). — *G. Mollugo* L. var. *pycnotrichum* H. Braun, Ofner Gebirge häufig (*G. hirsutum* Kit. in *Sadl. Fl. com.* Pest. I [1826], p. 121, non Ruiz et Pav.), b) *angustifolium* Leers, *β. nemorosum* Wierzb., Oravitza, c) *elatum* Thuill. var. *brevifrons* Borb. et H. Br. bei den Römischen Bädern (Budap.) (7).

Lonicera Caprifolium L. Bukin, Plavna (Borb. 1886).

Gentiana Clusii Perr. et Song. (*G. Rochelii* Kern.) Szulow (11). — *G.*²⁾ *Uechtrizii* (Sag. et Schn.) (*G. amarella* 10, *G. Carpatica* 22, non Kit., *G. pyramidalis* Kit. 1839, non Nees 1818) Zaskov (10), Barlangliget (Borb. 1890). — **G. Fatrae* Borb. (*G. Austriaca* 22, pro parte, non Kern.) a *G. Uechtrizii* quacum calycis sinibus rotundatis convenit, habitu robusto, corolla grandi, 30—35 mm. longa, a *G. castanetorum* autem foliis elongatis

¹⁾ *Lapsana glandulosa* Freyn et Sint. Oesterr. botan. Zeitschr., 1892, p. 266, non Wierzb., nec Simk., nec Freyn, Fl. v. Südistrien, p. 125. Ist die Freyn'sche Subspecies von meiner var. *adenocladus* verschieden, so muss die erstere in *L. Freynii* Borb. umgeändert werden.

²⁾ Kaum ist es dem Gefertigten gelungen, in das Chaos der „*G. Germanica*“ Ordnung zu bringen, so tauchen nicht wenige neue Namen auf. Ich gedenke demnächst mich über die seit 1891 publicirten Gentianen der fraglichen Gruppe zu äussern. Wettstein.