

L. (virgata) foliis lyratis, lobis retroverfis, extremo cordato, caule superne nudo, pedunculis unifloris, calyce hispido. *Desf. atl. 2. p. 235. t. 215.**

Crepis (gratula) foliis inferioribus lyratis obtusis, caule subnudo laxo ramoso. *Poiret. itin. 2. p. 227.*

Ruthenförmiger Rainkohl. W.

Habitat in Barbaria prope La Calle. 2.

4. LAPSANA communis.

L. caulescens ramosa, foliis ovatis petiolatis angulato-dentatis. W.

L. calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramobilissimis. *Hort. cliff. 384. Fl. suec. 649; 710. Roy. lugdb. 130. Hort. ups. 246. Dalib. parif. 244. Gmel. sub. 2. p. 40. Scop. carn. n. 988. Pollich. pal. 757. Fl. dan. 1. 500. Kniph. cent. 3. n. 48.*

L. caule brachiato, foliis ovatis, longe petiolatis, petiolis pinnatis. *Hell helv. n. 6.*

Sonchus sylvaticus. *Tabern. 192.*

Lamplana. *Dod. pempt. 675.*

Soncho affinis *Lapsana domestica.* *Bauh. pin. 124.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 115.

Gemeiner Rainkohl. W.

Habitat in Europae cultis. ☉ (v. v.)

*5. LAPSANA crispa.

L. caulescens ramosa, foliis ovatis petiolatis duplicato-dentatis. W.

Franzer Rainkohl. W.

Habitat — — — — — ☉ (v. v.)

Simillima precedenti a qua forte olim orta, sed e seminibus constans, differt: Folia argute duplicato-dentatis margine undulatis. W.

1423. ZACINTHA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1248.

Recept. nudum. Semina radii incurva, disci recta. Pappus brevissimus subplumosus. Cal. calyculatus, calyculo membranaceo.

1. ZACINTHA verrucosa.

Zacintha verrucosa. *Gaert. sem. 2. p. 358. t. 157. f. 7.*

Lapsana (Zacintha) calycibus fructus torulosis deprellis