

Hieracium primum latifolium. *Cluf. hist. 2. p. 139.*

In herbidis Caucaſi ſubalpini obuia. Floret Julio, Au-gusto. 2

405. LAPSANA. Recept. nudum. Cal. subcally-
culatus: squamis singulis interioribus
canaliculatis, fructifer connivens. Pappus
nullus.

* *Cauleſcentes.*

1629. LAPSANA communis.

L. cauleſcents ramosa, foliis ouatis petiolatis angulato-den-tatis, pedunculis calycibusque glabris.

L. cauleſcents ramosa, foliis ouatis petiolatis angulato-den-tatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1624. Flor. dan. t. 500. Curt. lond. Hall. hist. n. 6. Gmel. fib. 2. p. 40. n. 33. Pall. ind. taur.*

Sonchus fyluaticus primus. *Tabern. Kraeut. p. 500.*

Copiosa in graminofis inumbratis. Floret Junio, Ju-lio. ◎

1630. LAPSANA grandiflora.

L. cauleſcents ramosa, foliis ouatis petiolatis angulato-den-tatis, pedunculis calycibusque glanduloso-hispidis.

Habitat in Caucaſi alpe Kaischaur, ubi florentem Sep-tembri legi. ◎

Facies praecedentis. Flōres maiores: calycibus nigricanti-bus, corollulis intense luteis.