

Crescit in ripâ fluuii Terck, sub fortalitio Wladikawcas Floret Septembri. 2

Differt ab affini H. radicatâ, caule magis ramoso basique folioso, defectu pilorum et setarum in foliis atque calyce, pedunculis minus squamatis, pappo candido nec sordide-albo. Florum magnitudine H. radicatam vix superat.

1629*. LAPSANA *intermedia*.

L. caulescens ramosa, foliis angulato-dentatis: inferioribus lyrato-pinnatifidis, pedunculis calycibusque glabris, florum radio calyce longiore.

In Tauriae et Caucasi inumbratis, syluosis vulgari alibi specie frequentior. Floret aestate. ◎

Conuenit cum L. communi glabritie *paniculae* et *calycibus* viridibus, sed discedit flore duplo fore majore, quâ notâ L. grandiflorae assimilatur. *Hirsutie caulis* atque foliorum sicut L. communis variat.

1630. LAPSANA *grandiflora*.

Synonymon addé: *Catal. hort. gorenk. a. 1812. p. 33.*

Vulgo L. communi magis pubescit. *Pedunculorum* et *calycum* pubes in plantâ alpestri spontaneâ copiosa diminuitur in cultâ, quo in statu L. lyratam *Willdenouii* enum. *hort. berol.* p. 832 plane refert. Etenim *folia* in his adeo affinis speciebus nullum constans discrimin mihi suppiditare visa sunt: inferioribus felicit in omnibus lyrato-pinnatifidis, mediis indiuisis latis angulato-dentatis, superioribus angustis subdentatis.