

4. HYPOCHOERIS *glabra*.

*H. glabra*, calycibus oblongis imbricatis, caule ramoso nudo, foliis dentato-sinuatis. *Sp. pl. ed. W. 3. p. 1621.*

*Habitat in Dania, Germania, Belgio, Helvetia. ⊖. D.*

5. HYPOCHOERIS *radicata*.

*H. foliis runcinatis obtusis serratis, caule ramoso nudo laevi, pedunculis squamosis. Sp. pl. ed. W. 3. p. 1622.*

*Habitat in Europae cultioris pascuis. 2d. D.*

## 878. LAPSANA.

*Recept. nudum. Cal. subcalyculatus, squamis singulis interioribus canaliculatis. Pappus nullus.*

## † Acaules.

1. LAPSANA *foetida*.

*L. acaulis, scapo unifloro, foliis runcinato-pinnatifidis, lacinia terminali rhombea. Sp. pl. ed. W. 3. p. 1622.*

*Hyoseris foetida. Sp. pl. 1137.*

*Habitat in alpibus Austriae, Salisburgi, Helvetiae, Italiae, inque pratis Hungariae. 2d. D.*

2. LAPSANA *pusilla*.

*L. acaulis, scapo subtrifloro, pedunculis fistulosis clavato-incrassatis, foliis obovato-oblongis denticulatis. Sp. pl. ed. W. 3. p. 1623.*

*Hyoseris minima. Sp. pl. 1138.*

*Arnoseris pusilla. Gaert. fem. 2. p. 355. t. 153. f. 3.*

*Habitat in Europae arvis apricis. ⊖. D.*

## † † Caulescentes.

\* 3. LAPSANA *lyrata*.

*L. caulescens paniculata, caule inferne pubescente, foliis radicalibus lyratis dentatis, caulinis inferioribus ovatis dentatis, superioribus lanceolatis integerrimis.*

*Habitat ad mare Caspium. 2d. D.*

*Radix perennis subrepens. Caulis sesquipedalis et altior erectus paniculatus a basi ad medium pubescens. Folia radicalia et infima caulinis lyrata dentata utrinque pilis rarioribus obsita; caulinis sessilia, inferiora ovata dentata, superiora oblonga vel lanceolata integerrima ut radicalia pilis rariis brevibus obsita. Flores magnitudine Picridis hieracioidis. Calyces calyculati, squamis costa media setosis.*

## 4. LAP-