

planes, à nervure non saillante en dessous, par son inflorescence à pédoncules uniflores, par ses fruits ordinairement hérissés de longues soies et très gros relativement à la taille de la plante, etc. — Par ses feuilles et ses pédoncules uniflores, il se rapproche davantage des *G. Pyrenaicum* et *cæspitosum*; mais il en est très distinct par la longueur de ses pédoncules fructifères et par le volume de ses fruits ordinairement hérissés de longues soies.

SENECIO PERRALDERIANUS COSS. in herb. — *S. Atlanticus* Coss. in *Bull. Soc. bot.* III, 706, non Boiss. et Reut.

In pascuis et silvaticis montium *Tababor!* (*Kralik* pl. Alger. select. exsicc. n. 125 sub nomine *S. Atlanticus*) et *Babor!* Kabyliaë orientalis haud infrequens.

Cette espèce, que mon regrettable ami Henri de la Perraudière et moi avons découverte en 1854 dans le Djurdjura et que j'ai décrite sous le nom de *S. Atlanticus*, ne doit pas conserver ce nom spécifique, déjà attribué à une autre plante du genre par MM. Boissier et Reuter (*Pug. pl. nov.* 59), et je suis heureux de lui substituer celui de *S. Perralderianus* en souvenir de l'affection si dévouée que m'a montrée mon excellent compagnon de voyage dans l'exploration alors si difficile des montagnes du Djurdjura.

LAPSANA MACROCARPA COSS. ap. *Kralik Pl. Alger. select. exsicc.* n. 129.

*Planta annua*, radice brevi obliqua in fibras elongatas ramosas soluta. *Caulis* 3-12 decim. longus, erectus, teres, striatus, superne laxè corymboso-paniculatus, inferne pubescenti-villosus villis elongatis flexuosis patenti-subdeflexis, *superne pubescenti-glandulosus* pilis patentibus. Folia pubescenti-villosa; inferiora petiolata, lyrata lobo terminali ovato maximo repando-dentato basi sæpius cordato, lobis lateralibus sæpius binis oblongis parvulis vel etiam nullis; media brevius petiolata, ovata acuta vel acuminata, dentata; suprema sessilia, oblongo-lineararia vel linearia. *Capitula* quam in *L. communi* subdimidio *majora*, longe pedunculata pedunculis aphyllis subfiliformibus rigidis, apice ramulorum 3-8 in corymbum laxum disposita, corymbis paniculam generalem laxam efficientibus. Involucrum campanulatum, glabrum vel foliolis in costa media pilis perpaucis donatis, foliolis sæpius 9 æqualibus subuniseriatis oblongo-linearibus nervo medio prominente demum carinatis apice nigréscentibus etiam post achæniorum disseminationem suberectis, basi squamis 5-6 brevissimis subinæqualibus lineari- vel lanceolato-triangularibus demum inferne incrassatis et coadunatis calyculatum. Receptaculum minimum, nudum, foveolatum. *Flosculi* crocei, *involucrum paulo excedentes*. *Achænia fere 5 millim. longa, oblonga* inferne sensim angustiora, a dorso compressa, æqualiter multistriata, coronula et pappo destituta, areola epigyna angusta. — Junio-julio.

In pascuis regionis montanæ imprimis in terra mobili et ad silvarum mar-

gines: in monte *Edough!* (*A. Letourneux*) prope *Bône* haud infrequens, in *Kabylia orientali* in ditione *Beni-Foughal!* et in monte *Tababor!*

Le *L. macrocarpa* est très voisin, par la plupart de ses caractères et par son port, du *L. communis* dont il n'est peut-être qu'une variété remarquable. Il en diffère par la pubescence glanduleuse de la partie supérieure de la tige et des pédoncules, par les capitules et les akènes beaucoup plus gros. — Par sa pubescence glanduleuse il se rapproche du *L. adenophora* Boiss. (*Diagn. pl. Or. ser. 1, IV, 23*), mais il en est très distinct par les corymbes beaucoup plus lâches, par les capitules campanulés plus gros et moins nombreux, et par les fleurons dépassant peu les folioles de l'involucre, et non pas deux fois plus longs que ces folioles.

*LYSIMACHIA COUSINIANA* Coss. ap. *Kralik Pl. Alger. select. exsicc. n. 135.*

*Planta glabra, facie Anagallidis, radice et parte inferiore caulium induratis perennis, radice fusiformi* descendente in fibras nonnullas elongatas soluta. *Caules* sæpius plures, 1-5 decim. longi, *ascendentes vel diffusos-ascendentes*, cæspitem laxum efficientes, in parte inferiore interdum radican-tes, nonnunquam vinoso-purpurascens, subsimplices vel ramosi, *acute tetraquetri*, duriusculi demum inferne indurato-suffrutescentes. *Folia* crassiuscula, carnuloso-coriacea, nonnunquam cum caulibus purpurascens, opposita, sessilia vel inferiora tantum in petiolum brevissimum latiusculum attenuata, *ovata vel oblongo-lanceolata* acutiuscula vel obtusiuscula, *superiora angustiora sæpe lanceolata*, margine angustissimo subcartilagineo tenuiter denticulato-scabro. *Flores axillares, solitarii, pedicellis* filiformibus erecto-patentibus folia excedentibus sub anthesi rectis demum apice hamato-recurvis. *Calycis laciniæ lineares apice subulatæ*, margine membranaceæ. *Corolla* pulchre lutea, tubo brevissimo fere rotata, *sinibus edentulis, calyce subduplo longior, lobis oblongo-obovatis obtusis integris margine tenuissime* et brevissime ciliolato-glandulosi. *Stamina* 5, corolla dimidio breviora, subæqualia, fauci inserta, basi haud coalita et cum lobis corollæ basi non coadunata; *filamentis* filiformibus, glabris, anthera longioribus, *ovarium non tegentibus*; antheris oblongo-linearibus basi subsagittatis. *Appendices interstaminales* squamiformes, subglandulosæ, *brevissimæ subquadratæ*, in fauce corollæ ad unumquemque loborum sinum sitæ. Capsula chartacea, calycem subæquans vel brevior, globosa, glabra, regulariter 5-valvis vel valvis alterutris cohærentibus irregulariter dehiscens. *Semina* majuscula, immarginata, peltata, dorso convexiuscula, ventre valde convexa, pressione mutua angulata, testa crebre et tenuiter tuberculata. — Maio-julio.

In montium humiliorum silvaticis vel dumetosis in regione littorali provincie Cirtensis inter *Collo* et *Bougie* obvia: prope *Collo* in monte *Msalat!*, in montanis ditionis *Ouled-Atia!* ad amnem *Oued Zhour* a cl. *Cousin* præfecto militari ditionis *Collensis* primum inventa et inde ab ipso in horto culta,