

gis dentatis, superioribus lanceolatis integerrimis sagittatis, calyce adpresso cauleqve hirsutis. *W.*

Suppl.

Hab. — — 4. *D. intr.* 1814.

925. HEDYPNOIS.

6. (4-5). *H. CASPICA*: caulibus ramosis diffusis hispidis, foliis oblongis amplexicaulibus remote denticulatis, squamis calycis fructiferæ undiqve hispidis.

Hab. ad Mare caspic. ☉. *D. intr.* 1815. ex horto *Vindobon.* sub hoc nomine.

928. ACHYROPHORUS.

6. *A. BALBISII*: foliis runcinato-dentatis hispidis obtusis, caule subramoso nudo calyceqve glabro.

Hypochæris Balbisii Willd. Suppl.

Hab. in Italia? ☉. *D. intr.* 1815.

929. LAPSANA.

4. (1-2). *L. PUBESCENS mihi*: caulescens ramosa pubescens, foliis radicalibus pinnatis lyratis angulatis, superioribus ovatis basi pinnatifidis sinuato-dentatis, supremis lanceolatis sessilibus integerrimis, calycibus glabris.

Hab. — — ☉. *D. intr.* 1815 ex horto *Monspess.* sub nomine *Laps. grandifloræ*.

937. SERRATULA.

1. *S. TINGTORIA* γ. *integrifolia*.

Hab. in Europa. 4. *D. intr.* 1816.

938. CARDUUS.

24. (12-13). *C. TENUIFLORUS*: foliis decurrentibus sinuatis spinosis subtus tomentosus, calycibus subcylindricis aggregatis sessilibus, squamis lanceolatis erectiusculis. *Smith. brit.*

Hab. in Anglia. ☉. *D. intr.* 1817.