

Hab. in umbrosis rupestribus regionis inferioris montis *Cassii* et *Antilibani* suprâ *Zebdani*. Legi Maio 1846.

Affinis præcedenti a quâ differt indumento glanduloso partis inferioris plantæ, foliis vix lyratis pinnatipartitis segmentis copiosioribus, caule multò ramosiori polycephalo pedunculis brevioribus, involucri phyllis livescentibus radio breviori. *L. intermedia* characteribus in Diagnosi præcedenti datis longius differt. *L. adenophora* deniquè tota ad apicem usquè glandulosa est, habet prætereà folia lyrata, paniculam contractissimam, phylla ad medium setosa etc.

LAMPSANA RAMOSISSIMA Boiss.

L. biennis, infernè parcè pilis albis sparsis patulis flexuosis obsita supernè glaberrima, caule ferè a basi dichotomè ramosissimo effusissimè paniculato, foliis radicalibus lyratis lobis lateralibus utrinquè 3-4 oblongis subretrorsis acutis repando-dentatis terminali 2-3 plò longiori oblongo vel e basi truncato-subcordatâ triangulari acuto, foliis caulinis paucis linearibus acutis rameis brevissimis setaceis, pedunculis gracillimis capitulo obconico 6-8 plò longioribus, involucri basi brevissimè calyculati phyllis viridi-sublivescentibus glabris vel infernè puberulo-glandulosis apice membranaceis acutiusculis, flosculis radii involucri subduplò longioribus.

Hab. in *Libano* suprâ *Cedros*, in lapidosis regionis inferioris *Hermionis* suprâ *Rascheya*.

Speciei præcedenti valdè affinis sat tamen differre videtur caule a basi ramoso non glanduloso, capitulis paulò minoribus, involucri phyllis apice membranaceo-attenuatis. — Species ternæ hîc descriptæ forsan inter se nimis affines sed donec specimina intermedia eas formas unius speciei polymorphæ esse docuerint eas seorsim proponere debui.

KALPINIA SESSILIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

K. annua caulibus brevissimis sub anthesi sæpiùs nullis, foliis glaucis glabris linearibus brevibus integerrimis, capitulis ad collum et secùs ramos sessilibus minimis, involucri phyllis adpressis lanatis elliptico-linearibus albo-marginatis, acheniis striatis dorso aculeis patulis hamatis obsitis prætereà glabris in capitulis diversis dissimilibus aliis elongatis semicirculariter incurvis apice subampliatis vix bifidis, aliis