

de nos anciennes observations, que la description de l'ovaire.

Cet ovaire est court, tronqué à la base et au sommet, point comprimé, obovoïde, paroissant avoir quatre faces séparées par quatre côtes longitudinales grosses et arrondies; sa surface est hérissée de soies extrêmement longues, flexueuses, emmêlées; son aréole basilaire est large, orbiculaire, entourée d'un petit rebord formé par une saillie du corps de l'ovaire; l'aréole apicilaire est large, orbiculaire, un peu concave, entourée d'un rebord ou bourrelet vert, charnu, irrégulier, arrondi, formé par une saillie du corps de l'ovaire; il n'y a point d'aigrette. Chaque ovaire est supporté par un gros tubercule charnu, vert, celluleux, qui est une protubérance du clinanthe, et qui adhère à toute la surface de l'aréole basilaire, tellement que cette aréole semble être presque continue avec le support dont il s'agit. Ce support est un stipe analogue à celui qu'on observe sous chaque ovaire du *cotula*. (H. Cass.)

LASIOSPORE, *Lasiospora*. (Bot.) [*Chicoracées*, Juss. = *Syngénésie polygamie égale*, Linn.] Ce genre de plantes appartient à l'ordre des synanthérées, à la tribu naturelle des lactucées et à notre section des lactucées-scorzonérées, dans laquelle nous l'avons placé entre le genre *Scorzonera* et le genre *Gelasia*. Voici les caractères génériques du *lasiospora*, tels que nous les avons observés sur des individus vivans et secs de *lasiospora angustifolia* et de *lasiospora ensifolia*.

Calathide incouronnée, radiatiforme, multiflore, fissiflore, androgyniflore. Péricline subcylindrécé ou subcampanulé, inférieur aux fleurs extérieures, supérieur aux fleurs centrales; formé de squames subbisériées, appliquées: les extérieures courtes, ovales-lancéolées, coriaces, à partie supérieure souvent appendiciforme et subulée; les intérieures longues, oblongues-lancéolées, carénées sur le dos, membraneuses sur les bords. Clinanthe plan, fovéolé, absolument nu. Fruits pédicellulés, oblongs, cylindrécés, non collifères, munis de côtes longitudinales, hérissés d'un bout à l'autre de très-longes poils laineux, simples, appliqués; aigrette composée de squamelules nombreuses, très-inégales, plurisériées, filiformes, barbées et barbellulées. Corolles glabriuscules.

On connoit quatre espèces de ce genre.

LASIOSPORE A FEUILLES ÉTROITES: *Lasiospora angustifolia*, H. Cass.;