

SOMALIA SETT.: Costa dei Migiurtini, penisola di Hafùn costa di Mogà 18. V. (n. 602).

Launaea benadirensis Chiov. in L'Agricoltura Coloniale XX (1926) 46.

— *L. pumila* Chiov. (non O. Kuntze) *Le Collez. bot. Stefanini e Paoli* (1916) 107.

SOMALIA MERIDIONALE: Scogli e sabbie litorali di Mogadiscio oltre la stazione radiotelegrafica 15. II. (n. 61); Ras Sif presso Mogadiscio scogli e sabbie sulla riva del mare 12. II. (n. 75).

SOMALIA MEDIA: Sultanato di Obbia, duna e spiaggia di Obbia 22. IV. (n. 386).

A prima vista sembra una forma lignificata della *L. sarmientosa* (W.) Sch. bip.; ma ha le brattee involucrali più strette e brevi.

var. **caulescens** Chiov. Caule eretto robusto inferne indurato lignoso cortice rufo succulento-plicato 20 cm. alto; ramis numerosis tenuibus adscendentibus regulariter per intervalla 2 cm. longa foliosis. Folia spathulata, lamina terminali rotundata vel ovata vel obovata, apice non vel parum contracta, inferne abrupte constricta, anguste cuneatim attenuata, alato-petiolata, 2-3 cm. longa, 5-10 mm. lata. Capitula axillaria solitaria et apice caulis plura inflorescentiam glomeratam foliosam 3 cm. circ. diam. formantia.

Sonchus exauriculatus (Oliv. a. Hiern) O. Hoffm. ap. Engler *Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 421; Chiov. *Le Collez. Stefanini e Paoli* 107, 214; Rob. E. Fries in *Acta Horti Bergiani* VIII (1924) 110 n. 16.

SOMALIA MERID.: Caitoi sponde dello Scébeli presso le piantagioni 7. II (n. 58); Afgoi nel parco del Governatore 8. II. (n. 63); lungo il torrente Baidoa sotto la cascatta 26. III (n. 317).

GOODENIACEAE.

Scaevola plumieri (L.) Vahl *Symb.* II (1791) 36; K. Kraus in *Pflanzenreich* Heft 54 (IV. 277) 120 n. 1; Chiov. *Le Collez. Bot. Stefanini e Paoli* 108; Stefanini e Paoli *Relazione* 137. t. 5. fig. 6.