

superiora versus inflorescentiam decrescentia, minima. Involucrum 1 cm., altum, 5 mm. latum. Corollæ 1 cm. longæ.

Dunes de Tombouctou. — 18-21 juin 1899, n° 1299 [*Aug. Chevalier*].

Launæa virgata O. Hoffm. et Muschler.

Caulis teres, striatus, erectus, insigniter ramosus, glaber aut in parte superiore adpersus setis raris, apice glanduliferus. Folia ovato-lanceolata basalia et caulis folia inferiora in petiolum brevissimum angustata, margine integerrima, repanda vel rarius parce sinuato-dentata, infima sessilia linearia. Corymbi terminales, subcompositi, subumbellati. Capitula mediocria, longe pedicellata; involucri squamæ lineares, externæ breviores, imæ laxæ, anguste albo-marginatæ; ligulæ flavæ, subtus lividæ; achænia externa oblonga sulcata, olivacea, intima prismatica.

Planta 35 cm. alta. Folia inferiora 8-10 cm. longa, 2 cm. lata, superiora 3 cm. longa, 1,5 cm. lata. Involucrum, 1,5 cm. altum, 4-5 mm. latum.

HAUT-CHARI. — Dar Banda, Kaga M'Bra, terres cultivées, n° 654 [*Aug. Chevalier*].

Launæa Courtetiana O. Hoffm. et Muschler.

Planta perennis, glabra, caulis erectus vel ascendenti-ramosus. Folia glaucescentia, anguste lanceolata vel linearia, superiora denticulata inferiora sinuata, omnia basin versus in petiolum perbreve angustata. Capitula mediocria; involucri squamæ adpressæ, anguste albo-marginatæ, exteriores subcrassæ ovatæ, triangulares, interiores oblongo-lineares; ligulis flavis vel albido-flavis, subtus lividis; achænia oblonga, glabra, valde tuberculato-rugosa.

Planta cr. 50 cm. alta. Folia 5-8 cm. longa, 1 cm. lata. Involucrum, 7 mm. altum, 4 mm. latum.

MOYEN-CHARI. — Rég. du Iro, Koulfé, 29 juin 1903, n° 9083 [*Aug. Chevalier*].

Euphorbiaceæ.

Auctore L. BEILLE.

Thecacoris Juss.

Thecacoris Chevalieri Beille.

Arbor (?). *Ramuli juniores ferrugineo-pubescentes*, demum glabri. Folia breviter petiolata; petiolus cylindricus rugosus, pilosus, supra canaliculatus; stipulæ triangulares, pilosæ, deciduæ; limbus *membranaceus*, præter costam nervosque subtus parce pubescentes, glaber, obovato-ellipticus, *ad basim longe attenuatus*, ad apicem acuminatus; nervis 5-jugis, subangulo 45° a costa divergentibus, subtusque eminentibus. Flores dioici. Racemi ♂ axillares, *solitarii*; axis flexuosus, pubescens; bracteæ 1-floræ, ovatæ, pilosæ. Fl. ♂ *breviter pedunculati*: calyx 5-partitus; sepala 5, ovato-triangularia margine ciliata; petala 5, lineari-triangularia, superne ciliata; stamina 5, exserta; filamentis liberis, antheris rubellis; disci glandulæ 5, obconicæ, hirsutæ, ovarii rudimentum glabrum, vertice concavum,