

*Centaurea Hochstetteri* (BUCHINGER) OLIV. et HIERN, in « Fl. trop. Afr. », III (1877), 438.

(*Amberboa Hochstetteri* BUCHINGER in litteris, ex SCHIMP., « Pl. Abyss. », n. 1395 et 2183; *Amberboa abyssinica* RICH., « Tent. fl. Abyss. », I (1847), 453).

Javello: declivi e piede occidentale di Quota Littorio, lungo un uadi, m. 1600-1700, 27 aprile 1937, fi. fr. (591). — « Capolini lilacini ».

Distr.: Abissinia.

I nostri esemplari sono molto più piccoli di quelli dello SCHIMPER, i loro fusti molto gracili e soltanto puberuli, non floccoso-cotonosi, le brattee dell'involucro più lungamente acuminata e la loro punta non è niente indurata, nè nera, ma qualcuna sì e no appena più scura del resto.

*Lactuca taraxacifolia* (WILLD.) SCHUM. et THONN., « Beskr. Guin. Pl. », 380 (1827); OLIV. et HIERN, in « Fl. trop. Afr. », III, 451.

(*Sonchus taraxacifolius* WILLD., « Sp. pl. », III (1800), 1511).

Javello: declivi di Quota Littorio, ai lati della strada verso il paese, 18 aprile 1937, fi. fr. (434 e 442). — « Capolini gialli ».

Distr.: Africa tropicale.

*Launaea Cufodontii* LANZA, sp. n. (Fig. 88).

*Herba humilis, ca. 20 cm. alta, glabra, a basi ramosissima dumulosa, ramis divaricatis striatis glaucescentibus aphyllis, ad dichotomias tantum bracteolas minutas lineares basi dilatatas gerentibus. Folia infima (an proprie radicalia?) angustissime linearia, 5-12 cm. longa, 1-3 mm. lata, acuminata, integra vel laciniis perpaucis lateralibus remotis angustissimis, 4-12 mm. longis, donata. Capitula ad apices ramulorum solitaria, grandiuscula, cylindrica, involucri bracteis parce glandulosis, praeterea glabris, pluriseriatis, scarioso-marginatis, interioribus lineari-oblongis obtusiusculis, ca. 1,5 cm. longis et 2-3 mm. latis, exterioribus gradatim brevioribus acutis. Achenia (nimis immatura) arcte inter se adhaerentia, subcylindrico-prismatica, costulata, anguste sulcata, apice truncata, glabra, pappo 1 cm. longo, setis multiseriatis tenuissimis simplicibus subaequalibus, basi in anulum cohaerentibus.*

Mega: salendo il colle dell'ex-Consolato inglese, m. 1800, 6 maggio 1937, sfiorita (650).

Per lo stato imperfetto degli esemplari, la proposta specie resta dubbia.



Fig. 88. — *Launaea Cufodontii* Lanza, sp. n.

Mega, margini delle bocaglie sclerofille (650).