

lo. dilatato. Achenia linearia fusca vel nigricantia 5,5 mm. lo., compressa, facie externa convexa, interna plana ex apice rotundato 1,5 mm. la. sensim angustata, basi anguste rotundata 1 mm. la., marginibus fungoso-dilatatis 0,5–0,7 mm. latis, tota longitudine praedita, faciem internam latiuscule tegentibus adpresse pilosulis et minute glandulosis. Pappus aristis 2 ochroleucis vel albis 2,5–3 mm. lo. erectis linearibus e basi 0,3 mm. la. sensim angustatis, marginibus dense sursum ciliolatis.

Da semi ricevuti da Addis Abeba, coltivati nell'Orto Botanico di Genova, 12 gennaio 1938 (prof. A. BEGUINOT).

265. *Launaea farinulenta* Chiov. sp. n.

Planta tota in specimine circ. 16 cm. alta; caulis lignosus brevis 2 cm. et forsan magis elatus ad 7 mm. diam. crassus, cortice membranaceo ochraceo tectus, erectus, apice axillis foliorum superiorum dense ramosus, ramis, angulo valde acuto orientibus, inferioribus inferne 3–0 cm. foliosis, superne iterato furcato-divisis. Folia caulina et ramealia inferiora, circumscriptione obovata ad 5 cm. lo. 2,5 cm. la. basi non dilatata omnino exauriculata, profunde pinnatim divisa, rachide alata utrinque 1,5 mm. la., lobis discretis utrinque 3–6 anguste linearibus 6–15 mm. lo. 1–2 mm. la., integerrimis superioribus longioribus, inferioribus et interdum intermixtis brevioribus, omnibus apice acutissimis acumine chartilagineo candido calcareo, interdum in margines decurrente praeditis; supra glaberrima subtus ut rami pedicelli et involucrum pilis brevissimis stellatis farinulentis sparsa. Rami floriferi iterato furcato-divisi, internodiis cylindraceutis 2–3 cm. lo. 1–1,5 mm. crassis; bracteis lanceolatis vel lineari-triangularibus inferioribus 5 mm. lo. basi 1,5 mm. latis. Pedunculi 1,5–5 cm. lo. robusti erecti, bracteolis linearibus prope apicem quibusdam praediti. Capitula solitaria; involucrum 10 mm. lo. anthesi 3 mm. la., bracteis imbricatis, herbaceo-membranaceis extus pulverulento-puberulis, marginibus scariosis, exterioribus gradatim brevioribus ovatis et ovato-oblongis, intimis 5–10 mm. lo. 1,5–1,7 mm. la. apice obtusiusculis. Corollae e sicco videntur flavae 12–15. Achenia saepius curvula utrinque truncata biformia, exteriora 3–5 vacua obscure pentagona, albida laevia glabra 3 mm. lo., interiora ad 3,5 mm. lo., 10–12 griseo-virescentia costis plurimis sulcato-striata, minute scabro-puberula; pappus niveus 7 mm. lo. setis tenuissimis plurimis exterioribus flexuosis et lanuginosis.

Differisce da *L. tenuiloba* e affini per gli achenii esterni lisci e sterili, gli interni fertili e scabro-puberuli, per le foglie punto dilatate alla base.

Somalia meridionale: Zona Bokol, fra Bug Berde ed El Bar, 15 giugno 1930 (dott. R. GUIDOTTI, n. 12).

Nome indigeno: *Ana Ararsce*.