

## PICRIS.

197. — *P. HIERACIOIDES*, L.

L., Sp. pl. edit. 1. p. 792; Hook., Fl. of Brit. Ind., III, 393.

Moupine, in locis cultis. Jul. 1869.

## SONCHUS.

198. — *S. OLERACEUS*, L.L., Sp. pl. edit. 1. p. 794; Franch. et Sav., Enum. pl. Jap., I, 272.  
J. D. Hook., Fl. of Brit. Ind., III, 414.

Moupine, in locis cultis. Jul. 1869.

## LAUNÆA.

199. — *L. LAMPSANOIDES*, sp. nov.

Perennis, glaber; caulis gracilis, flaccidus, arcuato-ascendens, apice bifidus, ramis, monocephalis; folia glaucescentia, sæpius omnia basilaria, rosulata, petiolata, lyrata, lobis lateralibus minutis, dentiformibus, lobo terminali hastato-rotundato vel ovato, paucidentato vel integro, 10-12 mill. longo et lato; folia caulina, si adsint, tantum 1 vel 2, minima, bracteæformia, rarius evoluta, angulata; capitula longe pedunculato sæpius 2, rarius 3; involucrem glabrum, oblongum, bracteæ biseriales, exteriores multo minores, ovatæ, caliculum efficientes, interiores elongatæ, lineares, obtusæ, albo-marginatæ; ligulæ luteæ; achænia apice truncata (matura non vidi); pappus albescens.

Moupine, in silvaticis. Jul. 1869.

Port du *Pterotehca bifida*, avec les caractères des *Launæa*; feuilles rapelant assez bien par leur forme celles du *Lampsana apogonoides* Maxim. Le *L. asplenifolia* DC. est bien différent par la forme de ses feuilles, par ses tiges dures et très rameuses.

200. — *L. GLABRA*.*Microrhynchus glabra*, Wight Ic., tab. 1145.*M. acaulis*, Kurz in Journ. Asiat. Soc., 1877, II, p. 208.*Crepis acaulis*, Hook. fil., Fl. of Brit. Ind., III, 396.Var. *rufescens*. — Pappus rufescens; rami floriferi elongati.

Su-tchuen, in valle Yang tze Kiang, ad rupes udas. Fl. Nov. 1868.

La plante ressemble tout à fait au *Crepis acaulis* Hook. Mais l'aigrette est roussâtre et non pas blanche comme dans les spécimens de l'Himalaya et des Nilgherries; mais le caractère emprunté à la couleur de l'aigrette, très constant dans quelques genres, l'est beaucoup moins dans les *Crepis* et les *Launæa*. La forme des akanes, rétrécie dans leur tiers supérieur en un bec épais, tronqué au sommet, me semble rapprocher la plante bien plutôt des *Launæa* que des *Crepis*, auxquels M. Hooker l'a rapportée.

---

## CAMPANULACEÆ.

### CAMPANULA, L.

201. — *C. CANESCENS*, Wall.

Wall., Cat. 1289.

Clarke, in Hook., Fl. of Brit. Ind., III, 439.

Franch., Pl. David., Nouv. Arch. du Mus., 2<sup>e</sup> série, VI, 73.

Moupine, in locis cultis. Jul. 1869.

---

## ERICACEÆ.

### VACCINIUM.

202. — *V. MOUPINENSE*, sp. nov.

Fruticulus vix pedalis, ramosissimus, erectus, ramis apice tantum tenuiter puberulis; folia conferta, coriacea, glabra, oblonga vel ovato oblonga, obtusa, marginibus revolutis, petiolo brevi parce pilosulo; racemi axillares, glaberrimi, folio paulo longiores, 10-15-flori; pedicelli mox nutantes calyce longiores; calycis glabri dentes late triangulares; corolla alba, tubuloso-urceolata, dentibus brevissimis revolutis; stamina inclusa, filamentis inferne dilatatis, complanatis, breviter pubescentibus; baccæ...

Folia 12-15 mill. longa, 4 mill. lata; flores 4-5 mill. longi, corolla calyce 6-7-plo longiore.

Moupine, in rupibus adumbratis regionis excelsæ. Fl. Jul. 1869.