

SOMALIA SETT.: Costa dei Migiurtini, presso Uanane sul-Paltipiano 30. V. (n. 647).

*Launaea nudicaulis* (L.) Hook. f. *Fl. Brit. India* III (1882) 416, n. 5.

SOMALIA MEDIA: Sultanato di Obbia, duna di Magangib 19. IV. (n. 380).

SOMALIA MERID.: Ras Sif presso Mogadisio scogli e sabbie, sulla riva del mare 12. II. (n. 74).

*Launaea hafunensis* Chiòv., sp. nova.

Perennis caudicè elongate verticale, tenui, basi foliis delatis squamoso et collo lanuginoso; caule aereo brevi, in specimine 3,5 cm. lingo, dense folioso. Folia ambitu obovata, crassiuscula pergamenacea subearnosa, siccatate inserviente corrugata, glabra 4,5-6 cm. longa 2-3 em. lata, apice subtruncata, basi sensim cuneata et in petiolum alatum matteuata, non angulata, nec amplexicaulia, fero ad costam pinnato-laciñata, pluris profunde utrinque 1-2-lobulatis, rachide et lobulis integrinatis divaricatis, apice mucrone trigono carthilaginico albo-terminaliatis, 2-3,5 mm. latis, lobis insimis minimis dentiformibus. Caulis supra folias subnudus, divaricatim ramosus, foliis valde reductis bracteiformibus, ramis crassiusculis cylindraceis, pedunculis 1,5-3 em. longis robustis distanter bracteolatis, bracteolis minimis squamiformibus. Capitula anguste campanulata, squamis exterioribus late ovatis, late membranaceo-marginatis, interioribus oblongis 10-12 mm. longis 2 mm. latis, apice extremo obtusiusculis; receptaculum defloratum 2 mm. diam. latum. Achenia disci vacua 3 mm. longa glabra, 5-costata, laevi; pappus niveus copiosissimus tenuissimus. Reliqua desint.

SOMALIA SETT.: Costa dei Migiurtini, spiaggia e duna di Hafun 30. I. (n. 12).

Assai caratteristica per la forma e divisione delle foglie ricordante alcune specie del gen. *Senecio*. L'infiorescenza non supera le foglie. È affine alla *L. querouqta* (Forst.) Mischler.

*Launaea massauensis* (Fresen.) O. Kuntze *Rev. Gen. Pl.* II (1891) 351.

— *Heterachaena massauensis* Fresen. in Mus. Senckenb. III (1890) 74; Oliv. a. Hieron. ap. Oliv. *Fl. trop. Afr.* III, 455.