

PICRIS.

197. — *P. HIERACIOIDES*, L.

L., Sp. pl. edit. 1. p. 792; Hook., Fl. of Brit. Ind., III, 393.

Moupine, in locis cultis. Jul. 1869.

SONCHUS.

198. — *S. OLERACEUS*, L.

L., Sp. pl. edit. 1. p. 794; Franch. et Sav., Enum. pl. Jap., I, 272.

J. D. Hook., Fl. of Brit. Ind., III, 444.

Moupine, in locis cultis. Jul. 1869.

LAUNÆA.

199. — *L. LAMPSANOIDES*, sp. nov.

Perennis, glaber; caulis gracilis, flaccidus, arcuato-ascendens, apice bifidus, ramis, monocephalis; folia glaucescentia, sæpius omnia basilaria, rosulata, petiolata, lyrata, lobis lateralibus minutis, dentiformibus, lobo terminali hastato-rotundato vel ovato, paucidentato vel integro, 10-12 mill. longo et lato; folia caulina, si adsint, tantum 1 vel 2, minima, bracteæformia, rarius evoluta, angulata; capitula longe pedunculato sæpius 2, rarius 3; involucrem glabrum, oblongum, bracteæ biserialis, exteriores multo minores, ovatae, caliculum efficientes, interiores elongatae, lineares, obtusæ, albo-marginatae; ligulæ luteæ; achænia apice truncata (matura non vidi); pappus albescens.

Moupine, in silvaticis. Jul. 1869.

Port du *Pterotehca bifida*, avec les caractères des *Launæa*; feuilles rapelant assez bien par leur forme celles du *Lampsana apogonoides* Maxim. Le *L. asplenifolia* DC. est bien différent par la forme de ses feuilles, par ses tiges dures et très rameuses.

200. — *L. GLABRA*.*Microrhynchus glabra*, Wight Ic., tab. 1145.*M. acaulis*, Kurz in Journ. Asiat. Soc., 1877, II, p. 208.*Crepis acaulis*, Hook. fil., Fl. of Brit. Ind., III, 396.Var. *rufescens*. — Pappus rufescens; rami floriferi elongati.