

leus L. y *C. tingitanus* L., debo advertir que no se trata más que de especies sinónimas, empleadas doblemente por LINNÉ. BOISSIER supuso que la estampa de CAVANILLES, icones, tab. 128, representa el *C. coeruleus* DC. var. *incissus* DC., siendo la planta valenciana el *C. monspeliensium* All., frecuente en el reino de Valencia.

202. *Cirsium acaule* All. var. *angustifolium*. — Sierra de Baza.

Folia angustiora, lobulis ovatis, spinulis longioribus.

203. *Serratula nudicaulis* DC. var. *glauca* Pau. — *S. nudicaulis* Boiss., voy., p. 367. — *Carduus glaucus* Cav. — Sierra de Baza.

204. *S. leucantha* DC. — *Carduus leucanthus* Cav. — *S. flavescens* Poir. var. *leucantha* Willk.

Var. *mucronata* — *S. mucronata* Desf., fl. atl., II, p. 243, tab. 119. — «Folia integerrima, quandoque margine denticulato. Flores rosei aut roseo-violacei». Desf. l. c.

La planta murciano-almeriense trae flores rosadas, como la de Argelia, pero, difiere por el margen foliar abundantemente dentado. Cabo de Gata, Cerro de la Torre y Barranco del Sabinal.

BOISSIER nos dice: «J'ai comparé des échantillons authentiques des espèces que je réunis ici, et je les ai trouvés identiques».

La localidad clásica del *Carduus flavescens* L. (1753) = *C. inermis* Loeffling, iter hisp., p. 295 (1762) es Madrid, y según mis muestras de esta localidad, no puede identificarse con la *S. mucronata* Desf., ni con la *Centaurea cichoracea* L. = *S. flavescens* Poir., var. *cichoracea*; la primera por las escamas del antodio parecidas a las de la *S. leucantha* y la otra, por la decurrencia de las hojas, según advirtió LINNÉ. Y por más que BOISSIER afirmara que: «La plante n'a pas les fleurs roses comme il le dit par erreur...»; puedo afirmar que la poseo de Orán con las flores rosadas. Lo mismo las del Cabo de Gata, traídas por GROS, como las que vi en Cartagena. Probablemente, en Africa existen las dos especies, según mi herbario; de aquí quizás, se origine la equivocada afirmación de BOISSIER.

205. *Jurinea pinnata* DC.; nueva contrib., p. 53. — Cerro de Jabalcón; de Guadix a la Calahorra.

206. *J. humilis* DC.; contrib., p. 21; nueva contrib., p. 53. — Sierra de Gador: 2,000 m.

207. *Leontodon hispanicum* Merat; Boissier, voy., p. 379. — Venta de los Yesos, cerca de Sorbas.

208. *L. vernum*. — *Apargia verna* Salzm. — *Kalbfusia Salzmanni* Schultz — *Leontodon Salzmanni* Ball — Benanadux: II. IV.

Planta rarísima en España. (*K. Salzmanni* var. *hispanica* Lange, pug., p. 146).

209. *Scorzonera laciniata* L. — *Podospermum laciniatum* DC.; Boissier, voy., p. 361. — Nijar.

210. *Sc. angustifolia* L.; contrib., p. 22; nueva contrib., p. 54. — Mazarrón (Murcia).

211. *Taraxacum obovatum* DC.; Boissier, voy., p. 387. — Sierra de Mesa Contrata.

212. *Crepis Grosii* Pau; contrib., p. 23. — El Maimón, cerca de Vélez Rubio.

213. *Sonchus tenerrimus* L., f. *linearilobus*. — Benanadux.

Forma eglandulosa, pedunculis nudis. El *S. zollikoferioides* Rouy, según descripción, no difiere de esta forma, más que por los pedúnculos; carácter accidental en el *S. tenerrimus* y sus variedades.

214. *S. pustulatus* Willk., prodr., II, p. 242. — Entre Almería y Aguadulce.

Los viajeros PORTA y RIGO la recogieron en el Barranco del Caballar, yo en el Cabo de Gata.

215. *Launaia arborescens* (Batt.) Pau — *Sonchus spinosus* Boissier, voy., p. 391. — *S. arborescens* Batt. — *S. Freynianus* Huter, Porta y Rigo; Willk., suppl., p. 114. — *S. spinosus* var. *cervicornis* Lange — Benahadux; entre el Cabo de Gata y Almería (Gros, Pau).

216. *L. pumila* (Cav.) Kuntze — Mazarrón (Murcia).
217. *L. fragilis* Pau — *Lactuca fragilis* Asso — *Zollikoferia resedifolia* Cosson; (non L., sp. pl., ed, I, sub *Scorzonera*). — Benahadux; Santa Fé.
218. *L. nudicaulis* Hook. fil. — *Prenanthes runcinata* Lag. — Gador, Benahadux.
- 218 bis. *L. lanifera* n. sp. — Entre Almería y Aguadulce en los peñascos marítimos; p. 5, IV. Perennis, inermis, glabra, glaucescens, caule a collo dense floccoso, herbaceo ramoso, foliis late linearibus subbruncinatis parce lobatis, lobulis brevibus, triangularibus, longe decurrentibus, ramealibus breteiformibus; capitulis terminalibus cylindricis, longe pedunculatis, squamis late albo-marginatis, inferioribus triangulari-lanceolatis; achaenis linearibus, laeviusculis aliis transverse rugulosis. Habito de *L. arborescens*, cabezuelas de *L. nucaulis*.
219. *Hieracium baeticum* Arv. Touv. — La Sagra (Granada).
220. *H. aragonense* Scheele. *H. catolanum* Arv. Touv. — El Maimón, cerca de Vélez Rubio.
221. *H. amplexicaule*.; Boissier, voy., p. 392. — Sierra de Baza (f. *glutinosum* A. T.).
222. *Andryala ragusina* L. var. *macrocephala*. — *A. macrocephala* DC. — *A. Lyrata* Pourr. var. *macrocephala* Boiss., voy., p. 393. — *A. Ragusina* L. a) *lyrata* Willk., prodr., II, p. 271. — Gador.

CAMPANULÁCEAS

223. *Campanula Kremeri* B. et Rt. — Almería, Barranco del Caballar. No se trata más que de una forma cleistógama de la *C. dichotoma* L.
224. *C. decumbens* DC.; contrib., p. 24; nueva contrib., p. 55. — La Sagra y entre Guadix y La Calahorra.

ASCLEPIÁCEAS

225. *Periploca laevigata* Ait. — *P. angustifolia* Labill.; Boiss., voy., p. 404. — Cuevas de Vera.

GENCIANÁCEAS

226. *Erythraea major* Boissier, voy, p. 412, sec. Reuter, pl. exs. — Almería, Barranco de las Canteras.

He aquí una forma que no se puede identificar con ninguna de las que existen en la Península, a pesar de verla considerada como *E. Boissieri* Willk.; porque este autor (*Enumeratio plant.*, p. 48) da su especie con *corollae... lobis angustis, lineari-lanceolatis breviter acuminatis obtusis* y la muestra de GROS trae lóbulos corolinos oblongos aovados y con la punta redondeada. Es muy parecida a la *E. major* Hgg. et Lk., de la cual únicamente se aparta por el tubo de la corola corto y lóbulos de uno a dos milímetros menores.

227. *Centaurium cymosum* (Webb) Pau, f. *Barrelieri*. — *E. Barrelieri* Duf. — Mazarrón (Murcia). — Hojas radicales menores y más ensanchadas.
228. *C. pulchellum* (Horn.) Druce, f. *albiflora et tenuiflora*. — Benahadux.

CONVOLVULÁCEAS

229. *Convolvulus suffruticosus* Desf.; Lange, pugillus, p. 195. — Sitios rocosos del Barranco del Caballar; Adra.