

perne dense foliatus, inferne laxe, prope basim plus minusve nudus. Folia 7-13 approximata membranaceo-carnosula; petioli 5-7 cm. longi basi nudi, tenues; lamina circumscriptione obovata, pinnato-partita, foliola utrinque duo oblongo-ovata vel obovata opposita vel alterna dissita, inferiora minora 10-15 mm. longa, 3-5 mm. lata, superiora 2-3 cm. longa, 8-10 mm. lata, irregulariter lobulato-dentata, foliolium terminale ovato-romboideum utrinque 1-2-lobato-dentatum lobis ovatis 4-5 mm. longis acutis et superne dentibus brevibus et latis praeditum 4-6 cm. longum 2,5-4 cm. latum, foliola subtus secus nervos et margines rachidis et petioli pilis crispulis albis brevibus hispidula, supra glabrescentia. Pedunculus nudus vel inferne bracteolis 1-2 praeditus 23-29 cm. longus, cylindricus, apice praesertim crispule puberulus, 2-5 mm. crassus. Capitula 10 mm. diam. lata, 3-6 apice pedunculi laxe aggregata; bractee tenuissime lineares 15-20 mm. longae, basi 0,7 mm. latae; pedicelli 7-12 mm. longi dense puberuli, apice sub involucrium bracteolis crebris circ. 15 laxe dispositis tenuissime linearibus arcuato-patentibus 5-8 mm. longis 0,5 mm. latis suffulti. Involucrium subcylindrico-campanulatum, bractee circ. 25 ad 12 mm. longae 1,5 mm. latae, apice subulato-acuminatae, dorso fascia 0,5 mm. lata in sicco crasse bicostata parce hispida percursae, marginibus latiuscule membranaceis. Flosculi homogami circ. 60 lutei. Corollae 10 mm. longae, ima basi brevissime globoso-inflatae in $\frac{1}{3}$ supremo gradatim ampliatae, dentibus linearibus 1 mm. longis obtusiusculis. Stigmata exserta, apice penicillatim subtruneata, appendice brevissima conica terminata. Ovarium 10 costatum hispidulum; pappus niveus tenuissimus corollis parum brevior.

Boscaglia di Baidoa 5, XI, 1913 (Paoli n. 1110).

Lactuca taraxacifolia (Willd.) Schum. et Thonn.

Mogadiscio 30, V, 1913 (Paoli n. 135); fra Mahaddei Uen e Burbi-sciaaro 24, XI, 1913 (Paoli n. 1297).

OSSERVAZIONI. — Secondo il Paoli nome indigeno somalo e rahanuin: *Coblé*. È mangiata come insalata dagli indigeni.

Sonchus exauriculatus (Oliv. a. Hiern) O. Hoffm.

Uanle Uen 14, XI, 1913 (Paoli n. 1194); Nassib Bùnda 27, VI, 1913 (Paoli n. 406); Bidi 30, VI, 1913 (Paoli n. 445).

OSSERVAZIONI. — Secondo il Paoli fiori gialli; è mangiata come insalata dai somali che la chiamano *Ungi agàr*.

Launaea pumila Chiov. *sp. nova*.

Radix crassa 3-7 mm. diam. descendens, apice ramis abbreviatis sublignosis prostratis, articolato-cicatricosis 1 - 2,5 mm. crassis 1-10 cm.

longis caespitosis, humi stratis, nunquam flagelliferis, apice ramulis foliiferis et floriferis abbreviatis 1-3 cm. longis et aliis brevissimis pulviniformibus foliiferis tantum dense caespitosis et fere rosulatis. Folia parva densissima carnosa, glaberrima intense glauca, spathulata apice circ. 3 mm. lata, cum petiolis 8-12 mm. longa, utrinque sublyrato-lobulata, lobulis ab apice decrescentibus obtusis, inferioribus denticuliformibus et inferne sensim in petiolum basi exauriculatum attenuata. Pedunculi foliis breviores graciles 2-5 mm. longi, bracteolis minutis praediti; capitula solitaria ante anthesin 7 mm. circ. longa, 1,5 - 2 mm. diam. crassa; involucri squamis subtriseriatis extimis late ovatis obtusis 1,5 - 3 mm. longis, intimis 3-4 linearibus 8 mm. longis 1,5 mm. latis, apice attenuatis sed obtusis, maturitate dorso cartilagineo incrassatis et extus rotundatis, praeter apicem extus minute pilosulis glabris et intense glaucis. Flosculi ligulati 11-13, 4-5 radiales steriles, 7-8 centrales fertiles; ligulae flavae, radiales cum tubo 9 mm. circ. longae. Achenia longitudinaliter minutissime striolata, laevissima; fertilia nigra 3 mm. longa 0,4 mm. lata subtetragona, angulis lateralibus acutioribus, dorso leviter curvula, faciebus 1-2 costulis linearibus sulcis separatis percursis, basi breviter attenuata, apice parum longius contracta subrostrata, undique sub vitro papillis cinereis minutis tecta; pappus niveus 6 mm. circ. longus pluriseriatus, setis exterioribus tenuissimis, interioribus crassioribus subintegerrimis.

Affinis *L. crepoidi* Balf. f. et *L. nana* (Baker) = *Lactuca nana* Baker = *Sonchus nanus* O. Hoffm.

Spaggia di Mogadiscio 17, V, 1913 (Paoli n. 11).

Fam. GOODENIACEAE.

Scaevola Plumieri (Linn.) Vahl.

Comune fra Gumbo ed El Sai sulla duna mobile sulla spiaggia marina 21, VI, 1913 (Paoli n. 287).

Fam. CAMPANULACEAE.

Lobelia trialata Hamilt. var. ***grandiflora*** Chiov. Corolla circ. 6 mm. longa intense caerulea; antherae 1,5 - 1,7 mm. longae duo inferiores apice penicillatae, caeterae dorso breviter hispidulae.

Eghèrta lungo il torrente Matagòdi 26, VII, 1913 (Paoli n. 755).