

**Kalbfussia hispidula** (Del.) Bég. et Vacc. f. **macrocephala** (Bég. et Vacc.), comb. n.

*K. hispidula* var. *macrocephala* Bég. et Vacc. - Prodr. fl. cir., p. 476.

— — f. **platyphylla**, f. n.

Foliorum lacinae valde breviores et latiores (ideo potius lobi quam in typo, 3-9 mm. longae et 2-3 mm. latae (in sicco). Scapi et capitula majora ut in f. *macrocephala*, sed scapi 1-2-cephali.

In typo foliorum lacinae anguste lineares usque filiformes (in sicco).

**Launaea resedifolia** (L.) O. Ktze. var. **marmarica**, var. n.

Caules caespitiosi, robusti, 3-5 mm. crassi et circ. 35 cm. alti, inferne simplices, parte superiori valde ramosi, sub anthesi ramis suberectis; folia pinnatifida, rhachi 3-5 mm. lata, laciniis brevibus usque 2 cm. tantum longis, integris; capitula 20-25 mm. longa.

Caulibus validis, caespitosis, superne ramosis et capitulis magnis var. *longiloba* affinis, sed ramis suberectis et foliorum laciniis brevibus et integris a typo coeterisque varietatibus diversa.

— — var. **longiloba** (Boiss. et Reut.; Batt. et Trab.), comb. n.

— — var. **setacea** (Batt. et Trab.), comb. n.

**Notobasis syriaca** Cass. var. **inermis**, var. n.

Humilis, caule 15 cm. alto usque subnullo, capitulo folia floralia spinescentia carente.

**Pallenis spinosa** Cass.

*P. spinosa* var. *asteroidea* Prodr. fl. cir., p. 437 (p. p.: specim. Maugini, Giannattasio, Cassinera).

Valde variabilis. Varietates *asteroidea* et *villosa* formae extremae typo sensim conjunctae.