

*cm. longi. Capitula 5-7 mm. lata, involucri bracteis biseriatis herbaceis pilosis pilis longis crispis, margine et apice late hyalino-scariosis, exterioribus apice rotundato, interioribus anguste acuminato; receptaculo conico, paleis linearibus concavo carinatis, acuminatis, apice lutescente, integris; flosculis omnibus tubulosis luteis hermaphroditis fertilibus; acheniis maturis sub lente papillois, obconicis, incurvis, subquadrangulis 10-costatis, costis praecipue exterioribus conspicue tuberculatis, margine brevi truncato coronatis.*

Gregi mediterraneo-orientali, *A. persicae*, *A. divergentis*, *A. creticae* et *A. cyrenaicae* flosculis omnibus tubulosis et coeteris characteribus pertinet, sed acheniis conspicue tuberculatis ab omnibus omnino diversa.

*Cotula cinerea* Del. — Nuova per la Cirenaica.

*Centaurea furfuracea* Coss. et DR. — In Cirenaica finora era stata raccolta solo nei dintorni di Agedabia (*Cavara*, 1925).

*Spitzelia Saharae* Coss. var. *cyrenaica* Pamp., var. n.

Differt a typo omnibus partibus minoribus et undique densius hispido-tomentosa. Caules 6-10 cm. longi, folia circ. 2-3 cm. longa, capitula 8-10 mm. longa (in typo caules 10-20 cm. longi, folia circ. 4-7 mm. longa et capitula 15-20 mm. longa). Achenia ut in typo circ. 4½ mm. longa, sed interiora rostro brevissimo vix ½ mm. longo (in typo 1 mm. longo).

È specie nuova per la Cirenaica.

*Launea resedifolia* O. Ktze.

*Launea resedifolia* var. *pulchella* Pamp., var. n.

Differt a typo statura minori: caule 1-5 cm. tantum alto et in specimenibus minoribus interdum monocephalo, capitulis 10 mm. longis (in typo 10-14 mm. longi); nec non involucri bracteis exterioribus crassioribus et angustioribus, et foliorum lobis brevioribus et latioribus.

Per le dimensioni dei capolini e per l'aspetto delle foglie ricorda la var. *viminea* (Lange), e non escludo che l'esame di nuovi materiali possa suggerire di considerarla invece come forma di questa varietà.

*Launea glomerata* Hook. f. — Nuova per la Cirenaica.

MAATAN RISAM.: GASR ES SAHABI (18 e 20 aprile)

*Danthonia Forskalii* Trin. — Nuova per la Cirenaica. Era nota della Tripolitania, ma non in modo sicuro.

*Herniaria hemistemon* J. Gay

*Helianthemum sessiliflorum* Pers.

*Arnebia decumbens* Coss. et Kral. var. *macrocalyx* Coss. et Kral.

*Plantago albicans* L. var. *desertica* Pamp.

*Launea resedifolia* O. Ktze.


*Launea resedifolia* var. *pulchella* Pamp.

A SUD DI GASR ES SAHABI

(50 km. a sud dell'Uadi Faregh) (20 aprile).

*Aristida plumosa* L.

*Danthonia Forskalii* Trin.



1. *Scabiosa eremophila* Boiss. — 2. *Launea resedifolia* O. Ktze. var. *pulchella* Pamp. — 3. *Erodium Bonacellii* Pamp. — *Plantago ciliata* Desf. — 5. *Anthemis Kruegeriana* Pamp. — (Grandezza naturale).