

LEONTODON (*L. Gen.* 912; *Benth. et H. fil. Gen. Pl.* ii. 520).

*L. AUTUMNALIS* (*L., DC. Pr.* vii. 108, sub *Oporinia*; *Hoffm.*, sub *Apargia*), var. *ATLANTICUS*, *nob.* Planta nana glabra, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis, scapis nudis brevibus, involucri foliolis adpressis nitidis, acheniis immaturis apicem versus parum attenuatis, pappi radiis æqualibus ad basin vix incrassatis.

Mar. merid.—In convalle Ait Mesan circ. 2500 m.!

Var. *nostra* ad var. *minimam* (*DC. Pr. l. c.*) accedit. Hæc tamen differt capitulis albo-villosis.

*Ar. Geog.* Species per Europam septentrionalem et mediam, necnon in Sibiria late diffusa, fit rara in regione Mediterranea. Vidi tantum ex montibus Italiæ, Hispaniæ, Galliæ australis et Dalmatiæ.

*L. ROTHII*, *nob.*, = *Thrinicia hispida* (*Roth, Catal. Bot.* i. 99; *DC. Pr.* vii. 100, non *Fl. Fr.*), = *Colobium hispidum* (*Roth in Rœm. Arch.* i. 38), = *Thrinicia taraxacoides* (*Gaud. Fl. Helv.* v. 49, quoad var. *a.*), = *Leontodon nudicaulis* (*Solander MSS. in Herb. Mus. Brit.* pro parte, conf. *Lowe, Man. Fl. Mad.* i. 535), = *Hyoseris arenaria* (*Schousb. Gew. Marok*, 183), = *Thrinicia mauritanica* (*Spreng. Syst.* iii. 666, pro parte), = *Leontodon saxatile* (*Lam. Dict.* iii. 531).

Mar. sept.—Frequens in dit. Tingitana. Legimus pluries prope Tanger! et juxta promont. Spartel! Inter Tanger et Tetuan! juxta urbem Tetuan! et formam foliis pinnatifidis inter Tetuan et Ceuta! Habui ex arenosis Tingitanis ex herb. Webb!

Mar. occid.—Casa Blanca! Aïn el Hadjar et Djebel Hadid haud procul Mogador!

Mar. merid.—Occurrit passim in regione inferiore et in convallibus calidioribus Atlantis Majoris. Prov. Shedma! Marocco in rudertis! Seksâoua! Mtouga! Milhaïn! In convalle Ait Mesan usque 1600 m.!

— — —, var. *MAJOR* (*Boiss. Voy. Esp.* 378; *Willk. et Lge. Fl. Hisp.* ii. 214), = var. *microrhynchoides*, Ball, MSS. Folia sinuata vel repando-dentata, hispida, pilis (præsertim in nervo medio) apice glomchidiatis; pappus 10-radiatus, radiis externis paucis brevissimis. Huc forsân *L. nudicaulis* (*Lowe, Prim. Fl. Mad.* 47, sub *Thrinicia*) referenda.

Mar. occid.—Aïn el Hadjar haud procul Mogador!

Mar. merid.—In saxosis aridis reg. inferioris prov. Shedma! Misra Ben Kara haud procul urbe Marocco!

*Ar. Geog.* Species in regione Mediterranea occidentali (inclusa Macaronesia) satis frequens. Varietates plurimæ in Hispania et in Africa boreali.

Invito animo nomen novum proposui, dum nomen triviale *hispidus* ad aliam speciem Linnæanam pertinet; nomen *taraxacoides* improprium est, dum adsunt *L. taraxacum*, L., *L. taraxaci*, Lois., et *L. taraxacoides*, Rœnsch, et *L. arenarius* ad formam *L. hirti* (*Thrinicia hirta*