

× **C. medium** All. = *C. acaule* × *bulbosum*! — PO. Rochers d'Aïse, inter parentes (B). — Nouveau pour les Alpes Lémaniennes!

Carduus defloratus Linn. var. **crassifolius** Greml. = *C. crassifolius* Willd. = *C. summanus* Poll. — PE. Col de Plan Champ, versant de Vacheresse, rochers à 1600 m. (B). — Plante nouvelle pour les Alpes Lémaniennes. Voy. sur ses caractères : Briquet, *Herb. Tyrol mérid.* in *Bull. Lab. Bot. gén. de Genève* p. 285 (*Bull. Herb. Boiss.* juin 1897).

Serratula Rhaponticum DC. — Cette superbe espèce, caractéristique de la zone granitique centrale, n'existe pour notre dition que dans le massif de Platé, sur le flysch : HP. En montant de Sixt au lac de Gers (E. Saint-Lager); pentes des Grands Vans du côté du lac de Gers, où il foisonne par milliers d'exemplaires ! (Beauverd, B); crêtes de Véret (Beauverd, B).

Aposeris foetida Less. — Cette plante a la distribution suivante : PO. Bois de Sommans (B); le Pradely (Puget); Pointe de Vésine (B); col de Savan (B); pointe de Chalune (B); mont Pétetau (B); partie supérieure du vallon de Moussière (E. Saint-Lager, B); plateau des Gets au bois de Cambasson (Puget). PE. Chaîne de Lachau (Puget); Draversaz* (Jaccard). — HA. Bois en montant du Fond de la Combe à la Vaugeallaz (Puget, B). — HP. Partie supérieure des forêts sous la crête de l'Airon (B).

Leontodon autumnalis Linn. Observé sous les trois variétés suivantes :

Var. **integrascens** Briq., var. nov. — Feuilles basilaires, les unes oblongues-allongées et arrondies-obtuses au sommet, les autres lancéolées et presque linéaires, toutes *superficiellement sinuées-dentées*. Partie supérieure des pédoncules et écailles involucreaux pourvues de rares poils blanchâtres appliqués. — HA. Champs entre Sixt et Salvagny (B).

Var. **runcinatus** Briq., var. nov. — Feuilles basilaires oblongues-lancéolées, acuminées, mais à pointes subitement obtuses, toutes *profondément roncées-lobées* ou \pm *pinnatifides*, à lobes étroits séparés par de larges sinus arrondis. Partie supérieure des pédoncules et écailles involucreaux pourvues de poils blanchâtres peu abondants. — PE. Rocailles entre La Chapelle et le lac d'Ervins (B). — HA. Gravier des torrents au Fer à Cheval (B).

Var. **cinerascens** Briq., var. nov. — Feuilles basilaires oblongues-allongées, \pm profondément pinnatifides, à lobes étroits, séparés par des sinus arrondis. Partie supérieure des pédoncules et écailles involucreales *très velues, cendrées, entièrement couvertes de poils blanchâtres*. — Voisine de la var. *pratensis* (Link) Koch qui s'en distingue par ses poils *noirs*. — HA. Eboulis entre Salvagny et les Fonds (B).

Leontodon hispidus Linn. — Se présente dans les Alpes Lémaniennes sous les variétés suivantes :

α . **danubialis** Beck = *L. danubialis* Jacq. (1762) = *L. hastile* L. (1763) = *L. hastile* β *glabratus* Koch. — Feuilles *superficiellement sinuées-lobées, glabres ou presque glabres*. Pédoncules et écailles involucreales *glabres* ou pourvues de *quelques poils* rameux ou étoilés disséminés. — Très répandu dans les prairies, par exemple : HA. Prairies entre Samoëns et Sixt (B).

β . **vulgaris** Koch. = *L. hispidus* α *genuinus* Greml. = *L. hispidus* α *hypicus* Beck. — Feuilles \pm *sinuées-lobées*, couvertes ainsi que les pédoncules et les écailles involucreales de *nombreux poils rameux et étoilés*. — Variété la plus commune.

γ **opimus** = *L. hastile* γ *opimus* Koch. — Forme alpine à pédoncules épaissis sous le capitule, devenant parfois très élevée (et non pas toujours naine comme le dit Koch) dans les replats herbeux. — HA. Pic de Vaugeallaz (B). — HP. Grands Vans du côté du lac de Gers (B).

δ . **Oddæ** Briq., var. nov. — Feuilles *superficiellement sinuées-lobées*, d'un vert foncé, *très hispides* par l'effet de nombreux poils courts et raides bi-trifurqués au sommet. Pédoncules grêles, glabrescents, *très brièvement pubéruleux* sous le capitule. Écailles involucreales *vertes, glabrescentes* ou pourvues de poils *courts, rares et disséminés*, très brièvement *blanches-ciliées sur les bords*. Variété très saillante. — HA. Eboulis dans la partie moyenne du vallon d'Odda, bras gauche, 1800 m. (B).

Picris hieracioides Linn. var. **alpestris** Arv.-Touv. et Briq., var. nov. = *P. alpestris* Arv.-Touv. ined. ! — Plante robuste, à feuilles basilaires *oblongues, larges, planes*, superficiellement *sinuées-dentées* ou presque entières, très rudes, les caulinaires plus courtes *larges, amplexicaules*. Capitules nombreux, *gros*, en larges corymbes, à écailles involucreales extérieures