

53. *Thrinicia*. Hundesalat.

640. *T. hirta* [Roth. Cat. bot. 1, p. 98] (Haaret H.)
Apargia Sm., F. D. 1827; Rchb. l. c. tab. 1365.

Bladene rosetteformigt samlede ved Grunden, linie-lancetformede, tandede eller høvlformede, mere eller mindre haarede af i Spidsen alm. tokløvede Haar; *Skafterne* flere, bladløse, enblomstrede; *Blomsterkurven* før Udspringningen nikkende.

Kurvbladene var. haarede eller glatte; Bladene var. i Henseende til Indskjæring og Beklædning. Kronerne gule, paa Underfladen graaagtigt-røde. 7—9. 4.

Paa tørre Græsmarker og Bakker, sjelden: J. Haraldslund! Fjeldsted Bakker (H.); F. Ulriksholm (H.), Bøgeskovsgaard (19); Thorseng ved Valdemars Slot (1)! Loll. Hardenberg Park (Bornebusch)! Aalholm! Sj. Bidstrupgaard (P. Nielsen), Landbohøjskolens Plæner i Mængde! Vesterfælled (19).

Anm. *Leontodon hirtus* L., som alm. citeres til denne Art, beskrives med udelte Haar og Kronerne gule paa Underfladen, hvorfor den neppe kan høre herhid. Koch antager *Leont. Vilarsii* Lois. for den linneiske *L. hirtus*.

54. *Leontodon*. Løvetand.

641. *L. hispidus* L. (Stivhaaret L.) F. D. 862; Rchb. l. c. tab. 1368—69; *Apargia* Host, H. 813; *L. hastilis* Koch Syn. II, 481.

Stængelen furet, bladløs, i Spidsen udvidet, før Blomstringen nikkende, alm. udelt; *Bladene* tandede eller høvlformet-halvfinnede, tillige med Skaft og Kurvdække mere eller mindre stivhaarede af udelte eller 2—3-kløvede Haar; *Fnokkens Straaler* i 2 Kredse, den indre fjeret, den ydre kortere, ru.

Bladene var. i Indskjæring og Behaaring. Den glatte Form (*L. hastilis* L.) er, saa vidt mig bekjendt, ikke funden hos os. Ligner foreg., men er i alle Dele større. Kronerne gule. 5—9. 4.

Paa høje Enge, ved Randen af Veje o. a. udyrkede Steder alm. udbredt.

642. *L. autumnalis* L. (Høst-L.) Rchb. l. c. XIX, tab. 1366, fig. 2—3; *Apargia* Willd., F. D. 1996; *Oporina* Don.

Stængelen grenet (sjeldnere udelt), *Grenene* oprette, i Spidsen udvidede og beklædte med skjælformede Blade; *Rod-*

bladene glatte eller svagt haarede af ugrenede Haar; *Fnokkens Straaler* alle fjerformede.

Kronerne gule. 7—10. γ . Var. betydeligt i Henseende til Bladenes Indskjæring, Kurvdækkets Beklædning o. s. v. Blandt de mange Former udhæves:

β , *salinus* Aspegr. (integrifolius Bot. For. Cat.!) Bladene helrandede eller med faa og utydelige Tænder; Kurvbladene glatte eller svagt dunhaarede.

γ , *coronopifolius* (Bot. For. Cat.!) Bladene enkelt eller dobbelt fjersnitdelte med smalt linieformede Afsnit; Kurvdækket beklædt med løs, hvidagtig Dun.

δ , *nigro-lanatus* Fr. (Apargia Taraxaci Sm., H. 815; F. D. 1523; Hieracium Taraxaci L., Leontodon Lois., Rchb. l. c. fig. 1). Stængelen alm. udelt, Blomsterkurven større, med sorthaarede Kurvblade.

Meget alm. paa Enge, Græsmarker, ved Veje o. s. v., spiller især en betydelig Rolle paa vore Syltenge, paa hvilke Formen β , ligeledes forekommer (f. Ex. ved Lillestrand i J.). γ , paa tørre Marker og Overdrev ikke sjelden; δ , Mariager (Såby), paa Øerne i Vesterhavet: **Fanø**, **Sylt**, **Romø** (N.); **Bornh.** Højlyngen (Bergstedt), Christiansø (Didrichsen).

55. Picris. Bittermælk.

643. **P. hieracioides** L. (Rubladet B.) F. D. 1522; Rchb. l. c. tab. 1375.

Stængelen opret, bladet, i Spidsen halvskjærmformigt grenet; *Bladene* elliptisk-lancetformede, bugtet-tandede; *Stængelbladene* halvt omfattende; *Kurvbladene* i de ydre Kredse udstaaende eller tilbagebøjede.

Stængelen $1\frac{1}{2}$ —3' høj, tilligemed Bladene stivhaaret ru af enkelte eller kløftede Haar; Kronerne gule. 7—8. γ . Roden skyder Adventivknopper (Irmisch i bot. Zeit. 1851, p. 377).

β , *longifolia* Gaud. Fl. Helv. 5, 26. Bladene faa og fjerne, linie-lancetformede, næsten helrandede; Kurvene 2—5 paa Stængelen, med meget lange Kurvstilke.

Ved Randen af Veje, i Kratskove, bemærket i alle Provinser, (undt. Bornh.), ikke sjelden, men sporadisk. β , F. Telegrafskoven ved Nyborg!