

× **C. medium** All. = *C. acaule* × *bulbosum*! — PO. Rochers d'Aïse, inter parentes (B). — Nouveau pour les Alpes Lémaniennes!

Carduus defloratus Linn. var. **crassifolius** Greml. = *C. crassifolius* Willd. = *C. summanus* Poll. — PE. Col de Plan Champ, versant de Vacheresse, rochers à 1600 m. (B). — Plante nouvelle pour les Alpes Lémaniennes. Voy. sur ses caractères : Briquet, *Herb. Tyrol mérid.* in *Bull. Lab. Bot. gén. de Genève* p. 285 (*Bull. Herb. Boiss.* juin 1897).

Serratula Rhaponticum DC. — Cette superbe espèce, caractéristique de la zone granitique centrale, n'existe pour notre dition que dans le massif de Platé, sur le flysch : HP. En montant de Sixt au lac de Gers (E. Saint-Lager); pentes des Grands Vans du côté du lac de Gers, où il foisonne par milliers d'exemplaires ! (Beauverd, B); crêtes de Véret (Beauverd, B).

Aposeris foetida Less. — Cette plante a la distribution suivante : PO. Bois de Sommans (B); le Pradely (Puget); Pointe de Vésine (B); col de Savan (B); pointe de Chalune (B); mont Pétetau (B); partie supérieure du vallon de Moussière (E. Saint-Lager, B); plateau des Gets au bois de Cambasson (Puget). PE. Chaîne de Lachau (Puget); Draversaz* (Jaccard). — HA. Bois en montant du Fond de la Combe à la Vaugeallaz (Puget, B). — HP. Partie supérieure des forêts sous la crête de l'Airon (B).

Leontodon autumnalis Linn. Observé sous les trois variétés suivantes :

Var. **integrascens** Briq., var. nov. — Feuilles basilaires, les unes oblongues-allongées et arrondies-obtuses au sommet, les autres lancéolées et presque linéaires, toutes *superficiellement sinuées-dentées*. Partie supérieure des pédoncules et écailles involucreaux pourvues de rares poils blanchâtres appliqués. — HA. Champs entre Sixt et Salvagny (B).

Var. **runcinatus** Briq., var. nov. — Feuilles basilaires oblongues-lancéolées, acuminées, mais à pointes subitement obtuses, toutes *profondément roncées-lobées* ou \pm *pinnatifides*, à lobes étroits séparés par de larges sinus arrondis. Partie supérieure des pédoncules et écailles involucreaux pourvues de poils blanchâtres peu abondants. — PE. Rocailles entre La Chapelle et le lac d'Ervins (B). — HA. Gravier des torrents au Fer à Cheval (B).