

2026. T. hispida Roth cat. 1, 99. — *Bluff.* comp. 3, 432. — *T. hirta* *Rhb.* (non Roth) pl. crit. 8, f. 994—995. *Th. taraxacoides* *Gaud.* *Th. maroccana* *Pers.* *DC.* — *Hyoseris hispida* *Schousb.* — *H. taraxacoides* *Lam.* — Auf Salzthonboden bei Salzburg Jun. 1846; bei Moros Uyyar Jul. 1853. — (Der vorigen *T. hirta* ähnlich, aber durch die sparrige, steifere Beschaffenheit, Rauzigkeit der Blätter, kleinere Köpfchen und durch fast einfache einjährige Wurzel gleich zu erkennen. Die Verschiedenheit der Früchte lässt sich nur bei vollständiger Reife derselben wahrnehmen.)

443. LEONTODON L. p. p.

2027. L. autumnalis L. — (*Hedypnois autumnalis* *Huds.* — *Picris autumnalis* *All.* — *Scorzonera autumnalis* *Lam.* — *Oporinia autumnalis* *Don.* *DC.* prodr. 7, 108. — *Apargia autumnalis* *Willd.* *Bmg.* 1637.) — Auf Wiesen, Triften, unbebauten Orten, bis auf die Alpen, nach dem Standorte in der Form sehr veränderlich. Jun. Octb.

a. *alpigenus*. Scapo 6—9 poll., simplici vel parum ramoso ramis 1—2 cephalis, infimo glabro, superne piloso; foliis subpinnatifidis vel runcinato-dentatis; capitulis pusillis; peranthodii foliolis nigricantibus glabris; pedunculo longissimo squamato. Flosculis flavo-aureis. — Auf Triften der Arpaser und Kerzesorer Alpen. 6000'. Jul. Aug.

b. *nigro-hirsutus*. Radice repente. Caule superne ramoso piloso 1—1½ ped.; foliis minus dissectis glabris vel pilis longis albis simplicibus obsessis. Capitulis minimis; peranthodii foliolis nigro-hirsutis; pedunculo infra capitulo obsolete incrassato et squamato. Flosculis aureis. — In der Valle-Vinuluj der Rodnaer Gebirge. Jul.

c. *subalpinus*. Praecedens sed omnino glaber. — Auf Triften der Fogaraser Alpen im Sirnathal. Aug.

d. *latifolius*. *Bmg.* En. n. 1637, var. a. Caule pedali, erecto, ramoso; foliis latioribus sinuato-dentatis, dentibus lato-lanceolatis; fol. caulinis brevioribus; anthodio piloso.

e. *pinnatifidus*. *Bmg.* l. c. var. β . Caule ramosiore; foliis pinnatifidis, laciniis longis linearibus. Anthodiis subglabris; pedunculis squamatis. (An var. c. mihi).

f. *subbipinnatus, longifolius*. Caule ramoso foliisque glabro; foliis elongatis 10—12 poll. long. subbipinnatis, laciniis linearibus vel lineari-lanceolatis, integerrimis vel dentatis; rachi inaequaliter dentata. Capitulis longissime pedunculatis; peranthodii foliolis dorso hirsutis apice marginéque villosis. — Auf Salzboden. Salzwiesen gegen Hammersdorf bei Hermannstadt. Jul., Aug.

g. *pratensis*. *Koch* syn. ed. 2. p. 480. (*Apargia pratensis* *Lk.* *Handb. z. Erkenn. d. Gew.* 1, 791. — *A. Taraxaci* *Sm.* non *Willd.* — *A. autumnalis* β *Hartm.* — *Hieracium Taraxaci* *L.* sp. 1125. *Oporinia pratensis* *Less.*) — Ab antecedentibus var. differt. Caule robustiore 1⅓ ped. ramoso vel simplici; peranthodii foliolis pedunculisque dense fusco-pilosis; foliis sinuato-dentatis, vel pinnatifidis vel subbrunci-