

- seminibus asperis. (2) in pratis frequens. — Fl. fr. 4. p. 64. — Fuchs. hist. 821. ic. (v. v.)
2. T. MAJUS (Jacq. aust. t. 29.) foliis glabris planis basi latioribus, pedunculis apice incrassatis, involuci corollæ radio longioris squamis 10-12 lanceolato-ovatis acuminatis, seminibus echinatis. 2 in apricis Galliæ mediae, australis occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 64. Lam. ill. t. 646. f. 1. (v. v.)
 3. T. HIRSUTUM (Gou. monsp. 342.) caule foliisque basi supernè tomentosis, pedunculis apice incrassatis, involucris corollæ radio non longioribus. (2) in sterilibus apricis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 64. Garid. aix 466. t. 95. Præced. varietas? (v. s.)

* * *Floribus cœruleis vel violaceis.*

4. T. PORRIFOLIUM (L. sp. 1110.) caule stricto glabro, foliis linear-ensiformibus basi dilatatis, involuci squamis longè acuminatis corollâ planissimâ duplò longioribus. (2) in pratis provinciarum australiorum — Fl. fr. 4. p. 65. Jacq. ic. rar. t. 159. (v. v.)
5. T. CROCIFOLIUM (L. sp. 1110.) caule stricto tomentoso, foliis linear-subulatis, involuci squamis lanceolatis acutis corollâ sublongioribus. (2) in montibus subherbosis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 65. — Col. ecphr. t. 230. (v. v. DC.)

LXXXVI. THRINCIA Roth. cat. bot. 1. p. 98. DC. fl. fr. 4. p. 51.

Involucrum imbricatum; receptaculum favosum; semina disci pappo sessili plumoso et inæquali donata, radii breviter papposa, pappo abortivo.

1. T. HIRTA (Roth. l. c.) foliis lanceolatis sinuato-dentatis hirtis, scapo 1-floro, involucro glabro basi squamulis aucto. 2 in sterilibus arenosis ad vias. — Fl. fr. 4. p. 51. Leontodon hirtum L. sp. 1123. — C. Bauh. prod. p. 63. ic. (v. v.)
2. T. HISPIDA (Roth. cat. 1. p. 99.) foliis lanceolatis obtusis dentatis hispidis pilis furcatis, scapo 1-floro piloso, involucro canescente nudo. (1) in lapidosis et arenosis provinciarum australium occidentaliumque. — Fl. fr. 4. p. 52. Hyoseris taraxacoides Vill. dauph. 3. t. 25. (v. s.)
3. T. TUBEROSA (DC. fl. fr. 4. p. 52.) radice tuberosâ, foliis lyratis hirtis scabris, scapo unifloro nudo apice hirto. 2 in pratis circâ Monspelium, Nicæam, Aquas Sextias, Massiliam. — Leontodon tuberosum L. sp. 1123. — Lob. ic. t. 232. f. 1. (v. s.)

LXXXVII. LEONTODON Juss. gen. p. 170. DC. fl. fr. 4. p. 53.—Apargia Schreb. Wild.

Involucrum imbricatum; receptaculum favosum; pappus plumosus sessilis, pilis aliis squamosis aliis sericeis.

1. L. INCANUM (DC. fl. fr. 4. p. 56.) foliis oblongis subdenticulatis cano-scabris pilis apice radiantibus, scapo unifloro pubescente, involuci squamis linearibus acuminatis pubescentibus. 2 in pascuis excelsis Alpium Delphinensis, circâ Monspelium ex cl. Benth. — Hieracium incanum L. Jacq. austr. t. 287. — Vill. 3. t. 24. (v. s.)
2. L. SQUAMOSUM (Lam. dict. 3. p. 529.) foliis oblongis glabris subdentatis, scapo unifloro squamoso supernè hirto, involuci hirti squamis linearibus acutis. 2 in pascuis montosis. — Fl. fr. 4. p. 54. L. pyrenaicum Gou. ill. t. 22. f. 1. 2. Apargia Alpina Wild. — All. ped. t. 14. f. 4. (v. v.)
3. L. MONTANUM (Lam. fl. fr. 3. p. 640.) foliis runcinato-dentatis glabris, scapis unifloris nudis supernè incrassatis hirtis, involucris villosis. 2 in lapidosis Alpium Delph., et Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 54. Hedypnois taraxaci Vill. dauph. 3. t. 26. — All. ped. t. 1. t. 31. f. 1. (v. v.)
4. L. HASTILE (L. sp. 1123.) foliis runcinato-pinnatifidis glaberrimis, laciniis lanceolatis basi dilatatis subdentatis axi inclinatis, scapo 1-floro nudo glabro,

involueri squamis interioribus glabris. $\frac{1}{2}$ in pascuis humidis Galliæ occidentalis, mediæ, orientalisque. — Fl. fr. 4. p. 55. L. danubiale Jacq. aust. t. 164. — All. ped. t. 70. f. 3. Vill. dauph. 3. t. 24. (v. v.)

β . *arenarium*, foliis linear-lanceolatis indivisis subdentatis. — In sabuletis maritimis agri Syrtici propè Teste de Buch reperiit cl. L. Dufour. (v. s.)

5. L. *HISPIDUM* (L. sp. 1124.) radice præmorsâ, foliis pinnatifido-oblongis laciniis nervo medio perpendicularibus hispidis pilis bifurcatis, scapo unifloro subglabro, involueri squamis lanceolatis acutis subhirsutis. $\frac{1}{2}$ in lapidosis apricis. — Fl. fr. 4. p. 55. excl. var. β et γ . 5. p. 453. (v. v.)

6. L. *CRISPUM* (Vill. dauph. 3. p. 84. t. 25.) radice simplici verticali, foliis runcinato-pinnatifidis laciniis linear-lanceolatis nervo medio inclinatis hispidis pilis apice ramosis, scapo 1-floro hirto, involueri squamis lanceolatis acutis basi sublanatis. $\frac{1}{2}$ in siccis Delph., Occitanie, Pyren. ex Lapeyr., Bellovaci ex cl. Graves. — Fl. fr. 5. p. 454. (v. v.)

7. L. *VILLARSII* (Lois. gall. 514.) radice subsimplici verticali, foliis pinnatifidis laciniis linear-lanceolatis nervo medio perpendicularibus hispidis, pilis simplicibus, scapo 1-floro, involueri squamis hispidulis glabrisve, interioribus lanceolatis acuminatis. $\frac{1}{2}$ in siccis apricis Delph. infer., Galloprov., Occitanie, agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 5. p. 454. L. hirtum Vill. dauph. 3. p. 82. t. 25. (v. v.)

8. L. *AUTUMNALE* (L. sp. 1123.) foliis lanceolatis pinnatifidis glabris, scapis ramosis declinatis squamosis, pedunculis sub involucro tumescientibus, involueri squamis puberulis lanceolatis acuminatis. $\frac{1}{2}$ ad margines agrorum et viarum. — Fl. fr. 4. p. 53. — Fuchs. hist. 320. ic. (v. v.)

β . *simplex*, caule 1-floro. — eng. bot. t. 830. (v. v.)

LXXXVIII. PODOSPERMUM DC. fl. fr. 4. p. 61. — Scorzoneræ sp. L.

Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis; semina pedicellata pedicello cavo incrassato; receptaculum seminibus delapsis tuberculato-muricatum; pappus sessilis plumosus.

1. P. *CALCITRAPÆFOLIUM* (DC. fl. fr. 5. p. 455.) caule basi ramoso, foliis petiolatis pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis, terminali longiore lanceolatâ, superioribus simplicibus, seminibus angulatis glaberrimis. $\frac{1}{2}$ in provinciis australibus et circâ Parisios. — P. resedifolium Fl. fr. 4. p. 61. non L. — Barr. ic. 800. (v. v.)

2. P. *LACINIATUM* (DC. fl. fr. 4. p. 62.) caule ramoso erecto, foliis petiolatis pinnatifidis laciniis linearibus acuminatis, terminali longissimâ linear-lanceolatâ, superioribus linearibus, seminibus subangulatis glaberrimis. (2) ad marginem agrorum. — Scorzonera laciniata L. Gærtn. fr. 2. t. 159. f. 1. S. petiolaris Lapeyr. abr. supp. 120. (v. v.)

3. P? *SUBULATUM* (DC. fl. fr. 4. p. 61.) caule subramoso infrâ folioso supernè nudo, foliis rigidis linearibus carinato-subulatis. $\frac{1}{2}$ Sorricinii. — An Scorzoneræ pinifoliæ Gou. ill. 53. var? (v. s. in specim. imperfecto.)

LXXXIX. SCORZONERA DC. fl. fr. 4. p. 59. — Scorzoneræ sp. L.

Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis; receptaculum nudum; semina sessilia; pappus substipitatus plumosus.

1. S. *HIRSUTA* (L. mant. 278.) caule 1-floro, foliis linearibus subhirsutis obtusis, involueri squamis lanceolatis acuminatis glabris, seminibus lanatis. $\frac{1}{2}$ in lapidosis sterilibus Occitanie, Galloprovinciæ circâ Massiliam et montem Victoriæ, Rupellam. — Fl. fr. 4. p. 60. — Hieracium capillaceum All. ped. t. 31. f. 3. (v. v. DC.)

2. S. *ANGUSTIFOLIA* (L. sp. 1113.) caule subnudo unifloro apice tomentoso, foliis sublinearibus basi lanatis, involueri squamis subglabris subobtusis, exterioribus lanceolato-ovatis, interioribus linear-oblongis. $\frac{1}{2}$ in Galliâ mediâ, australi occidentalique. — Fl. fr. 4. p. 60. Gm. sib. 2. p. 2. t. 1. (v. v.)