

- gia arenaria Moretti ex Reich. *Apargia Berinii* Jan! pl. exs. *Ap. canescens* Sieb.! pl. exs. *Pappus basi rufus*, non strictè uniserialis (ut depictus à cl. Reichenb.) sed setis paucis extùs stipatus. (v. s.)
8. *L. INCANUM* (DC. fl. fr. ed. 3. n. 2975), foliis lanceolatis acutis subdenticulatis pube stellatâ utrinque canescentibus, scapis glabriusculis folia multò superantibus squamellas acuminatas paucas gerentibus, invol. pilis simplicibus paucis subhispidulo.  $\mathcal{L}$  in rupibus collibus montosis et pratis alpium à Delphinatu ad Austriam, in Carinthiâ (Graaf.), Foro-Julii (Suffr!), Carniolâ (Scop.), circâ Ratisbonam (Hopp!), Muggendorf (Koch!), etc. *Hieracium incanum* Linn. syst. 522. Jacq. fl. austr. t. 287. *Apargia incana* Scop. carn. ed. 2. n. 982. Sturm deutschl. fl. ic. Leontodon Alpinum Vill. dauph. 3. p. 94. t. 24 non alior. *Apargia angustifolia* Schleich. exs. ex Gaud. fl. helv. 5. p. 56. (v. s.)
9. *L. ASPERUM* (Reichenb. fl. exc. 1. p. 252), foliis radicalibus dentatis runcinatisve pilis rigidis trifurcatis asperis ciliatisque, caule scaposo 1-cephalo (rarius bifido 2-cephalo) glabriusculo striato, invol. squamis dorso pilis simplicibus scabridis, achæniis elongatis apice scabridis, pappi setis exterioribus subplumosis.  $\mathcal{L}$  in Hungariæ sylvis lapidosis (Kit.), Germaniâ boreali (Reich.), in Pyrenæis ad portum Venasque (DC!), fortè in Sicilia ex specim. Gussoniano subdubio. *Apargia aspera* W. et Kit. pl. rar. hung. 2. t. 110. *Apargia Guestfalica* Bonning. ex Reich. (v. s.)
10. *L. SAXATILE* (Reichenb. fl. germ. exc. 1. p. 252), foliis lineari-oblongis dentato-pinnatifidis densè hispidis pilis brevibus apice 3-4-furcatis, scapis folia longè superantibus pilis rarissimis puberulis, invol. pilosiusculis pilis simplicibus aut subfurcatis, achæniis præsertim apice muricatis.  $\mathcal{L}$  in apricis montium calcareorum circâ Tergestum (Hopp. Dnby!), in regnò Neapolitano (Ten! Guss! Schouw!), insulâ Capræâ (Ten! Reyn!), Corsicâ (Thom!), Monspelii (Gir!), Græciâ (Auch!), *Apargia saxatilis* Ten! cat. 1819. p. 59. fl. neap. t. 72. *Apargia Tergestina* Hopp! pl. exs. *Hieracium*, etc. Col. ephr. 1. p. 243. ic. (v. s.)
11. *L. BORYI* (Boiss! ined.), foliis radicalibus pinnatifidis, lobis obtusis subintegris, pilis rigidulis confertis apice trifurcatis hispidis, scapis folia superantibus pilis apice 2-3-furcatis hirtellis, invol. oblongo glabro, achæniis læviusculis longius rostratis, pappi setis exter. paucissimis.  $\mathcal{L}$  in campis aridis Sierra-Nevadæ regni Granatensis ad altit. 6700-9500 ped. (Boiss!). *Apargia hispida* Bory flor. Sierra-Nev. n. 15. *Herba pygmæa* affinis *L. crispo* sed distinctissima. Pili foliorum breves conferti, scaporum longiores ramosi. (v. s. à cl. inv.)
12. *L. CRISPUM* (Vill. dauph. 3. p. 84. t. 25), foliis radicalibus acutè runcinato-pinnatipartitis, pilis apice 2-3-furcatis hispidis subcanescentibus, scapo foliis duplò longiore hispidulo, invol. squamis dorso hispidis pilis longis subsimplicibus bifurcatisve, achæniis breviter rostratis regulariter tuberculato-muricellatis.  $\mathcal{L}$  in asperis apricis vallium Alpinarum Delphinatùs, Valesiæ, Pedemontii. DC. fl. fr. suppl. p. 454. *Apargia crispa* Willd. sp. 3. p. 155 r. *Leontodon hispidum*  $\gamma$  fl. fr. n. 2972. (v. v. et s.)
- $\beta$ . glabriusculum.* — in valle Alpina Sancti-Nicolai. Reuter! (v. s. in herb. Reut.)
13. *L. BISCUTELLÆFOLIUM*, foliis radicalibus basi in petiolum attenuatis oblongis pinnatifidis pilis apice 2-3-furcatis hirtis, scapis striatis parcè strigillosis simplicibus aut rariùs bifidis, invol. squamis ciliatis dorso pilosis linearibus acuminatis, exterioribus apice recurvis, achæniis muricellatis.  $\mathcal{L}$  in pascuis siccis Apennini Neapolitani (Ten!) et Romani (Mor!), in Tauriæ herbis (Bieb. Stev!). *Apargia crispa* var. *macrorhiza* Ten! syll. 394 non Gunth. *Apargia Hispanica* Bieb. fl. taur. n. 1600 excl. Cav. syn. *Andryala lanata* Habl. taur. 155. ex Bieb. Pubescentiâ accedit ad *L. saxatilem*, sed inv. squamis ext. longis lineari-subulatis subpatulis differt. (v. s.)
14. *L. VILLARSII* (Lois. fl. gall. 514), foliis radicalibus sublinearibus apice dilata-