

hispida Smith Engl. Bot. 554. Foliis plus vel minus pinnatifidis; indumento et magnitudine multum variat, et in sequentem videtur in montosis transire, folia viva plerumque undulato - crispa. — Auf Triften, Wiesen, Anhöhen, Heiden (A. erectorum Kl. et Richt.). — Mai. Juni. Aug. Sept. 4

* 1652. *L. hastile* L. foliis subspathulato - lanceolatis elongatis planis deorsum dentatis anthodioque glabriusculis. Jacq. austr. 164. *Picris danubialis* All. ped. t. 70. f. 1. *L. danubiale* Jacq. Praecedente glabrior et gracilior, scapo in primis superne non tam incrassato, foliis plerumque planis, plus vel minus sinuato-dentatis. — Auf Triften, Wald- und Bergwiesen. — Mai. Jun. Aug. Sept. 4

1653. *L. incanus* Scop. scapo simplici subnudo, anthodio pubescente, foliis lanceolatis acutis subdenticulatis cano-scabris, pilis multifidis. *Hieracium incanum* Linn. — Jacq. a. t. 287. *Aparg. incana* W. Sturm Fl. VII. 27. — An sonnigen Kalkhügeln in Oestreich bei Baden: Sauter, in Baiern bei Muggendorf: Koch, b. Ettrizhausen b. Regensburg: Hpp. Cent. Binder, Kapuzinerberg bei Salzburg: Hpp. Tyrol, Oberitalien. — April. 4

1654. *L. Berinii* (Apg.) Bartl. cano-scaber, caulis subramosis basi foliosis, foliis cuneato-lanceolatis sinuato-subdentatis. Rchb. pl. crit. VIII. *A. arenaria* Moretti. Achenia scabra. — Bei Togliano, Monfalcone, im Friaul: Berini (e manu)

CCCXXIX. *Picris*. *L.* Bitterkraut. *Anthod.* e squamis planis aequalibus, basi minus accessorium patens. *Rec.* alveolis lacinulatis. *Achenia* incurva, fusiformia, reticulato-sulcata, pappo plumoso, sessili.

1658. *P. hieracioides* L. foliis lanceolatis sinuato-dentatis amplexicaulis hispidis, capitulis ramoso-corymbosis, anthodio viridi-canescente. Engl. Bot. 196. Gärtn. 2. t. 159. f. 2. Schk. 216. Fl. dan. 1522. Pedalis et ultra, magis vel minus hispida. — An Wiesenrändern, Feldrainen, in Wäldern. — Jul. Aug. ♂

* 1659. *P. ruderalis* Schm. foliis lanceolatis ciliato-dentatis, pedunculis anthodiisque hispidis. *P. paleacea* Vest. Videtur secundum specimina bohemica et styriaca, forma praecedentis hispidior, humilior, etiam culta et viva non aliter distinguitur, foliorum enim dentura variabilis est

Bartl. am Sande des Isonzo: Moretti. — Jun. Jul. 4

1655. *L. autumnalis* L. scapo ramoso, pedunculis squamosis, anthodio elongato canescente, foliis lanceolatis pinnatifidis glabriusculis. *Hedypnois autumnalis* Smith Engl. Bot. 830. Ap. autumn. W. Schk. t. 220. Variat insigniter forma foliorum, a linearibus subintegerrimis dentatisve ad lineari pectinato-pinnatifidas et interrupte laciniatas, ab anthodio glabro ad incanum, caule corymboso et submonocephalo: *Aparg. Taraxaci Horn* Fl. dan. t. 1523. — Auf Triften, Feldrainen, Hügeln. — Aug. Sept. 4

1656. *L. pratensis* (Apg.) Lk. scapo ramoso, foliis lanceolatis sinuato-dentatis pinnatifidisque glabris, anthodio fusco-villoso. *Hier. Taraxaci Tim.* Praecedente robustior et pariter varians forma foliorum; sed vix varietatem diceres quum hoc anthodii indumentum villosum sit insigne. E sem. auct. colui et sponte-neam legi. — Auf den Strandwiesen bei Warnemünde und bei Malchin in Meklenburg, bei Dresden an der Weisseritz vor dem Dorfe Plauen. — Aug. Sept. 4

† 1657. *L. Brumati* (Apg.) Schiede: scapo unifloro, anthodio basi laxo. — Um Triest nach Schiede. —

Obs. *Apargia hyoserooides* Vest. B.Z. 1820. 7. seu *Hyoseris taraxacoides* Wulf. in Belgia lecta, quid sit, vix divinabis.

CCCXXX. Picris. *L.* Bitterkraut. *Anthod.* e squamis planis aequalibus, basi minus accessorium patens. *Rec.* alveolis lacinulatis. *Achenia* incurva, fusiformia, reticulato-sulcata, pappo plumoso, sessili. atque fallax. — An Felsen bei Prag: Prsl. in Steyermark: v. Vest, — Jul. Aug. ♂

1660. *P. umbellata* N. v. E. foliis amplexicaulis lanceolatis obtusis repando-denticulatis hirtis, capitulis umbellato-cymosis, anthodio atro-virente. *Leontod. umbellatus* Schrk. *Apargia rigens* Mart. ined. *P. hierac. angustifolia* Wallr. — Auf Berg- und Voralpenwiesen, an steinigen Orten im Gebüsch: am Gra-seck im Aufsteigen nach dem Wettersteine in Baiern: v. Martens, in Thüringen: Wallr. daselbst in der Gegend von Cölleda an Kalkbergen: Rchb. — Jul. Aug. ♂