

folio, flore minore. Morif. Hist. 3. p. 75. Sec. 7. t. 7. f. 6. (*scapo squamis perperam destituto*)
Leontodon pyrenaicum. Gouan. Illust. p. 55. t. 22. f. 1. & 2. *An Leontodon hastile.* Lin. *Picris.* Hall. Helv. no. 26. *Picris saxatilis.* Allion. Fl. Ped. no. 766. t. 14. f. 4.

β. *Idem foliis pilosis, scapis altioribus.*

Quoique cette espèce offre beaucoup de variations dans sa grandeur & dans la forme de ses feuilles, en général elle est glabre ou presque glabre, & on la reconnoît facilement aux écailles, linéaires - sétacées, éparées sur les hampes. Linné dit que son *Leontodon hastile* est dépourvu de ces écailles, ce qui nous fait méconnoître l'espèce qu'il décrit; mais peut-être parle-t-il d'après la figure de Morison, dont il cite le synonyme.

Au reste, cette plante a sa racine oblique, tronquée ou comme rongée, courte, garnie de longues fibres qui s'enfoncent dans la terre. Ses feuilles sont radicales lancéolées ou oblongues, ovales, rétrécies vers leur base en pétioles quelquefois fort longs, & varient à bords presque entiers, & à bords dentés plus ou moins profondément. Le plus souvent elles sont très-glabres; mais dans la variété β., qui s'élève davantage, elles sont velues plus ou moins abondamment. Les hampes sont grêles, au moins une fois plus hautes que les feuilles, glabres dans la plus grande partie de leur longueur, & dilatées sous les calices, où elles sont souvent noirâtres & un peu velues. Ces hampes sont munies d'écailles linéaires, subulées & éparées. La fleur est d'un beau jaune. Les semences sont oblongues, & ont une aigrette sessile, à poils plumeux. Cette plante est commune sur les montagnes de l'Auvergne, du Dauphiné, de la Suisse des Pyrénées, &c. ☞. (v. v.). M. Villars partage plusieurs des synonymes de cette plante entre son *Hedypnois pyrenaica* (Pl. de Dauph. vol. 3. p. 78.) & son *Leontodon protheiforme* (ibid. p. 87.). La synonymie qu'il rapporte à ce dernier nous a parue curieuse.

3. LIONDENT crépidiforme; *Leontodon crepidiforme.* *Leontodon foliis lanceolato-oblongis dentatis glabris, scapo apice squamoso & tomentoso, calyce laxiusculo.*

An picris danubialis. Allion. Flor. Ped. no. 768. t. 70. f. 3.

Cette plante, assez différente de celle qui précède, par son aspect, n'en est peut-être, malgré cela, qu'une variété. Sa racine est courte, comme tronquée, & garnie de fibres. Ses feuilles sont longues de quatre pouces ou un peu plus, rétrécies en pétiole à leur base, bordées de dents anguleuses & distantes, & glabres des deux côtés. Les hampes sont presque une fois plus longues que les feuilles, & glabres dans la plus grande partie de leur longueur; mais,

vers leur sommet, elles sont garnies d'écailles subulées, & d'un duvet cotonneux, blanchâtre ainsi que le calice qui les termine. La fleur est petite, courte, à écailles calicinales très-étroites, dont les extérieures sont un peu lâches, comme dans les Crépis. Cette plante croît dans les provinces méridionales de la France, aux lieux montagneux. (v. f.). Ce ne peut être le *Leontodon hastile*, puisqu'elle n'a point son calice glabre.

4. LIONDENT tubéreux; *Leontodon tuberosum.* L. *Leontodon foliis runcinatis scabris, calyce acuto hirsuto.* L.

Dens leonis asphodeli bulbulis. Bauh. Pin. 126. Tournef. 468. *Chondrilla altera dioscoridis monspeliensium.* Lob. Ic. 232. *Taraxaconoides chondrilla folio, asphodeli radice.* Vaill. Act. 1721, p. 170.

Sa racine consiste en plusieurs tubérosités fusiformes, ramassées en paquet comme dans l'Asphodelle, & terminées par de longues fibres. Les feuilles sont pétiolées, oblongues, un peu obtuses, roncées; à découpures latérales, irrégulières & courbées en bas; ces feuilles sont chargées de poils courts, principalement sur les bords. Les hampes sont un peu plus longues que les feuilles, velues, sans écailles. Elles portent à leur sommet une fleur jaune, dont le calice est pareillement velu, sur-tout à sa base. Cette plante croît dans les régions australes de la France, le Piémont, à la côte de Barbarie, dans les prés. ☞. (v. v.).

5. LIONDENT hispide; *Leontodon hispidum.* *Leontodon foliis lanceolatis laciniato-dentatis hispidis; laciniis sursum & retrorsum versis, pilis sercatis.*

α. *Dens leonis foliis canescentibus villosis.* Tournef. 468. *Hieracium montanum, dentis leonis folio incano s. laciniatum lanuginoso folio.* Bauh. Pin. 128. *Hieracium folio hedypnoidis.* Clas. Hist. 2. p. 142. *Dens leonis montanus hirsutus, folio longo dentato.* Morif. Hist. 3. p. 76. sec. 7. t. 8. f. 13.

β. *Dens leonis foliis hirsutis & asperis.* Tournef. 468. *Hieracium caule aphylo hirsutum.* J. B. 2. p. 2038. *Picris.* Hall. Helv. no. 25. *Leontodon pratense.* Fl. Fr.

Les deux variétés, que je réunis ici comme appartenant à la même espèce, ne diffèrent entr'elles que par la profondeur des découpures de leurs feuilles, & par l'abondance des poils fourchus dont elles sont hérissées.

La première (var. α), dont le feuillage est assez bien exprimé dans la figure citée de Morison, & que nous croyons être la même plante que le *Leontodon crispum* de M. Villars, a ses feuilles plus hérissées & plus profondément découpées que la seconde. Elle pousse de