

XIX. SYNGENESIA. POLYGAMIA AEQUALIS.

chondrifl. 8. PRENANTHES flosculis denis, calycibus octofidis, foliis lanceolatis: radicalibus indivisis subdentatis.

Ard. spec. 2. p. 36. t. 17.

Habitat in Europa australi. 2.

Caulis paniculatus. Folia caulina linearia, ad ramifications tantum, minuta. Radicalia lanceolata, petiolata, nuda, minute dentata.

japonica. 9. PRENANTHES flosculis subquindenis, foliis radicalibus lyratis, caule subnudo.

Habitat in Japonia. Kleynhoff.

Folia Radicalia lyrata (*Lapsana communis*), obtusiflora, vix denticulata, nuda. Caulis paniculatus, vix basi foliosus foliis lanceolatis. Flores numerosissimi, minimi; latae pedunculis capillaribus. Calyxes calyculati; Flosculi circiter 35. Pappus simplex, calyces longior.

mentatum. 9. LEONTODON foliis ovatis: petiolis dentatis, scapo nudo unifloro.

Hieracium foliis ovato-lanceolatis dentatis petiolatis: petiolis dentatis. *Hall. emend. IV. n. 251.*

Habitat in Helvetia. 2.

Folia omnia radicalia, ovata, fere lyrata, integriflula, subincana. Petioli longitudine foliis dentati. Scapi simplices, uniflori, longitudine foliorum. Calyx erectus, cineraascens.

neglecta. 15. CREPIS fol. amplexicaulibus runcinatis subpilosis, calycibus inermi-subspinosis, caule paniculato.

Habitat in Italia. ①.

Caulis pedalis, ramosus, subpilosus, erectus. Folia Radicalia obovato-oblonga, dentata, subpilosa. Caulina amplexicantha, runcinata, subpilosa dentibus elongatis etiam baseos. Summa subbastata. Rami floriferi elongati, nudi, laevi, apice biflori s. bifidi. Calyx exterior brevissimus, acutus; interior 8 s. 10 foliolis, in medio una alterave spina inermi notatis; Convenit cum C. pulchra magnitudine & parvis floribus; differt foliis, non integris subdentatis