

radicalibus, caulis scapiformibus simplicibus vel rariū supernē bifurcī foliis subsesquialongioribus parcē setaceo-squamulosis sub capitulo incrassatis, involuci phyllis ab exterioribus patulis ad intima sensim auctis omnibus longē setaceo-acuminatis undiquē pilis densis brevibus furcatis obsitis, ligulis concoloribus tubo longioribus, acheniis cylindricis supernē subattenuatis aculeolatis pappo albo eis subbreviori terminatis, pappi setis omnibus a basi plumosis exterioribus brevioribus.

L. biscutellæfolium in pl. Heldr. Anat. 1846. non. DC.

Hab. in rupestribus Pisidiæ propè Tcheltickchi, Maio. (Heldr.)

Folia cum petiolo 8-9 poll. longa 6-9 lin. lata, scapi 12-14 pollicares, capitula magnitudinis eorum *L. asperi*. Affine *L. Græco* et *aspero* facile distinguitur foliis elongatis breviter et remotè dentatis et impennis involuci phyllis longē et tenuissimè acuminatis.

LEONTODON DIVARICATUM Boiss.

L. perenne totum indumento densissimo pilis apice stellatis constanti canum pannosum asperulum, caulis flexuosis a basi 2-4 ramos edentibus ad dichotomias foliosis, ramis divaricatis flexuosis monocephalis parcē et brevissimè squamosis sub capitulo incrassatis et valde asperis, foliis lanceolatis inferioribus in petiolum attenuatis remotissimè et acutè 2-3 dentatis caulinis integris, involuci phyllis pilisstellatis inordinatim asperulis adpressiusculis ab infimis brevibus ad intima lanceolato-linearia sensim elongatis, ligulis concoloribus basi pilosis tubo subæquialongis, acheniis apice subattenuatis muriculatis pappo albo eis sublongiori terminatis, setis pappi omnibus a basi plumosis.

Hab. in Tauro Ciliciæ Kotschy, № 324.

Cæspitosum? Caules subpedales, rami 4-5 poll. longi, folia inferiora semipedalia 5-6 lin. lata, capitulum magnit. ejus *L. asperi*. Species a præcedentibus distincta indumento densiori pannoso, caulis ramosi ramis divaricatis, acheniis abbreviatis. — Species *Leontodontis* h̄ic descriptæ characteribus forsitan nimis lœvibus distinguuntur, sed æquo jure ac plurimæ generis naturalissimi admittendæ sunt donec saltem observationes ulteriores inter eas intermedia occurrere nos docuerint.

SCORZONERA MULTISCAPA Boiss. (Sect. *Euscorzonera*.)

Sc. radice fusiformi verticali, collo nudo, foliis omnibus radicalibus