

C. C. C. H.-Pl., partout. Sicile, Maroc. Type très variable ou M. Pomel a distingué les formes suivantes :

K. cirtensis. — Achaines un peu plus longs que leur bec.

K. oranensis. — Achaines un peu plus courts que leur bec.

K. algeriensis. — Achaines égalant le bec ; plante pubescente.

K. Reboudii. — Écailles extérieures de l'aigrette très étroites. Djelfa.

K. parvifolia. — Plante glabrescente, grêle, à tiges étalées ; feuilles linéaires, pectinées, à lobes étroits, dentés ; fruits bleuâtres à bec plus court qu'eux. Brezina.

K. Salzmani Schultz-Bip. — Achaines extérieurs élargis au sommet. Maroc, Espagne (n. v.)

Sous-genre FIDELIA Schultz-Bip.

F. Reboudiana Pomel. — Aspect du *Kalfbussia Mulleri* ; en diffère outre les caractères du sous-genre par ses hampes ramifiées presque dès la base ; achaines tous brièvement rostrés. ① Zab oriental (Reboud). Plante voisine du *Fidelia hispidula* Schultz, figuré dans la Flore d'Égypte de Delile, pl. 42 ; en diffère par ses achaines à bec moitié plus court et son péricline moins régulièrement imbriqué. Une autre forme voisine *F. trivialis* Ball (sub *Leontodon*) se trouve au Maroc.

Sous-genre ASTEROTHRIX Cassini.

A. hispanica DC. ; Munb., cat. ; *Spitzelia aspera* Pomel. — Feuilles sinuées-pinnatifides ou roncinées, très hispides comme toute la plante, à poils simples ou brièvement bifurqués ; hampes le plus souvent simples (1-3 décim.) ; achaines du disque atténués en bec plus court qu'eux et portant une aigrette plumeuse ; achaines de la périphérie non rostrés, terminés par une cupule fimbriée. ♀ H.-Pl., 3 prov. A. C. Djebel-Antar, Djelfa, Batna, etc., etc. Espagne.

NOTA. — Je n'ai vu en Algérie que la plante à achaines dimorphes. En Espagne elle a tantôt des achaines dimorphes, tantôt rien que des achaines rostrés, à aigrette plumeuse.

Sous-genre LEONTODON L.

Plantes vivaces ; feuilles toutes ou presque toutes en rosette radicale, hispides ; hampes simples ou rameuses ; capitules assez gros ; péricline imbriqué à écailles souvent indurées à maturité ; achaines rugueux transversalement, à aigrette plumeuse, sessile ou sur un bec court.

§ 1. *Dens-Leonis*. — Achaines non atténués en bec; aigrette à soies plumeuses avec des poils simples plus courts. Plantes très hispides, à poils brièvement bifurqués au sommet.

L. helminthioides Cosson et DR., inédit.; Munb., cat.; Ball, spic. — Aspect de l'*Asterothrix hispanica*; hampes plus robustes (2-5 décim.), souvent rameuses; achaines de 8 millim.; aigrette de même longueur à poils tous plumeux. ♀ Juin-juillet. Montagnes du Sud. Aurès, Maroc.

L. Djurdjuræ Cosson et DR., inédit.; Munb., cat.; Lx, cat. Kab. — Plante très hispide comme les précédentes, à scapes ordinairement simples, grêles; achaines de 6 millim.; aigrette munie à la base de nombreux poils simples; écailles du péricline s'indurant fort peu. ♀ Juin-juillet. Toute la grande chaîne du Djurdjura.

§ 2. *Oporinia*. — Achaines atténués en bec; soies de l'aigrette toutes plumeuses; plantes couvertes de courts poils étoilés.

L. Balansæ Boissier, diagn., § 2-III, p. 89; Munb., cat.; *L. hispidus* var. Cosson. — Souche épaisse, noire, horizontale, tronquée; feuilles lancéolées ou oblongues, subentières, dentées ou sinuées-pinnatifides; hampes de 2-5 décim., simples ou rameuses; achaines de 1 cent. sans l'aigrette, finement rugueux, striés en long. ♀ Juin-juillet. Aurès, Bou-Thaleb, Dréat, Garrouban, etc.

L. autumnalis L., var. *atlanticus* Ball. Maroc.

L. coronopifolium Desf., voy. *Spitzelia*.

PICRIS L.

Involucre ovoïde, urcéolé ou campanulé, à écailles internes unisériées, s'indurant à la fin; écailles externes herbacées, imbriquées ou verticillées; réceptacle un peu fibrilleux; achaines des *Leontodon*, dont ces plantes diffèrent surtout par leur tige plus habituellement rameuse et feuillée.

Clef des sous-genres :

1	{	Écailles du péricline linéaires, les internes indurées et contractées à maturité, rarement étalées à la fin, hispides	2
		Écailles du péricline larges, non indurées à maturité, les externes ovoïdes, cordiformes ou lancéolées.	3
2	{	Achaines tous atténués en bec	PICRIS.
		Achaines dimorphes	SPITZELIA.