

N.° 6589. **Phagnalon saxatiliforme saxatile** Nob.

=Ph. saxatiliforme nob.; grex saxatile, Bol. Soc. Iber. (1929), p. 44.

Hab.—Barcelone: Massif du Tibidabo, coteaux granitico-schisteux, vers Bellesguart et Valdoncellas.

N.° 6590. **Erigeron Verguini** Nob.; grex *Villarsi* Bell.?

Perenne cæspitosus; caulibus striato-laxepilosis brevi-unifloris; foliis oblongis longe attenuatis in petiolis valdepilosis alatis uninnervis, nervo in flabello explanato, caulinis subamplectantibus oblongo-acutis a basi ad summum valde dissimilibus sed regulariter distributis; periclinio plusquam lato 15 mill, ut 8 mill. alto circiter ad papum rufum mensurato; flosculis rubentibus filiformibus in sicco; ligulis nullis an haud visibilis.

Hab.—Cerdagne: Gorges de Llo, éboulis calcaires herbeux de Castellvidre, vers 1520 m. Associé à *Phyteuma eynense* et *pyrenœum*, *Laserpitium Nestleri* et *latifolium*, *Lilium Martagon*, *Molopospermum Cicutarium*, etc.

N.° 6594. **Centaurea aurigerana** Nob.=*C. Debeauxii* × *nemoralis* Nob. vel *C. nigra* var.

Foliis a *C. Debeauxii* et periclinio a *C. nemoralis* sed amplexiore; exteris bracteis araneoso-pallescentibus disco longe lanceolato; floribus radiantibus; achænis papposis 4 mill. longis, umbilico barbato.

Hab.—Pyrénées de l'Ariège: Artigues, prairies, 1200 m.

N.° 6599. **Soyera lampsanoides** Monnier.

Hab.—Pyrénées de l'Ariège: Massif du Llaurenti, Artigues, à «Pla del Bosc», futaie de sapins, 1600 m. En société avec *Valeriana pyrenaica*, *Sonchus Plumieri*, *Anthriscus Faurei*, etc.

Note.—L'espèce distribuée présente deux formes, non séparées dans les parts:

var. *pallescens* Nob. periclinio pallido et pappis a bracteis valde superantibus;

var. *fucescens* Nob. periclinio fusco ac bracteis subulatis pappis fere æquantibus.

N.° 6601. **Leontodon Duboisi** Nob. a Dr. F. J. Widder viso et consensu.

Caudice crasso fibroso cæspitoso-multicipite; scapis exfoliatis simplicibus vel parceramosis plus minuve contortibus striato-

glabribus parcebracteolatis infra calathiis tenuiter claviformibus; foliis parce runcinatis, nonnunquam subintegribus vel quidem integribus; periclinii bracteis imbricatis eglandulosis parcecrispato-lanuginosis versum cuspidum albescentibus; ligulis a pappo in flabello plumosos superantibus; achæniis rubentibus angulosis 5 mill. circiter longis sensim in rostro attenuatis pappo albo vix brevioribus.

Hab.—Cerdagne: Font-Romeu, pâturages alpins, vers 1800 m.

Note.—L'espèce comprend plusieurs formes ou variétés.

fa. *simplex* 1-2 cephalis;

fa. *ramosus* atque ramis contortibus adscendentibus;

fa. *uliginosus* grandiflorus elongato-parceramosis.

Les 2 premières variétés sont répandues par les ras pâturages alpins humides ou subhumides à *Myosotis Rouxi*, *Euphrasia* sp. plur., *Gentiana pyrenaica*, *Selaginella spinosa*, *Swertia Fontisromæi perennis*, etc.

Le Dr. Widder en parcourant nos *Leontodon* y a reconnu le *Duboisi* des Pyrénées centrales, et de la Serra de Montgrony, dans les Pyrénées de Catalogne. Il y a reconnu aussi *L. helveticus* Mérat.

N.º 6604. **Leontodon autumnalis** L. ssp. *Widderi* Nob. var. *latifolius* nob.

=*L. autumnalis* L. (s. l.) Widder.

Elatius crasso-multiramis plus minusve latifolius; foliis magnis irregulariter laxo-oblongo-laciniatis longe attenuatis in petiolis alatis longis plusquam 40 cent.; pedunculis longis in summo parvibracteolatis ac fere claviformibus; periclinii bracteis a pappo rufo vix superantur plus minusve hirsutis in cuspidate extero, ligulis periclinio superantibus; receptaculo profunde foveolato, foveolarum marginis elevatis; achæniis aliis rubentibus aliis pallescentibus (vacuis?) potius prismaticis quam cylindræis.

Hab.—Cerdagne: Estavar et Llivia, marges et prairies, 1200-1250 m. environ.

Note.—Dans le Bol. Soc. Arag. (hodie Soc. Iber.) (1916) p. 240-241, nous avons décrit *L. autumnalis* var. *ramosus* Nob. et var. vel ssp. *capcirenensis* Nob. de Cerdagne et du Capcir.

N.ºs 5797 et 6006. **Swertia perennis** L. var. *Fontisromæi* Nob. Caulibus brevibus vix 10 cent. longis; foliis breve ellipticis vaginantibus, superis amplexicaulibus; racemis oliganthis: sepalis lanceolatis, petalis oblongo-obtusis.