

dad de las cabezuelas; todas las hojas radicales atenuadas en la base, comúnmente lampiñas, oblongas ú oblongo-lineares, enteras, sinuadas ó runcinadas; folíolos del involucro *negrucos*, pubescentes ó pelosos, linear-lanceolados, más cortos que los aquenios maduros con el vilano; cabezuelas de 1 cm. próximamente de diámetro; aquenios de 2-2,5 mm. de longitud; pelos del vilano en 2 series, *no ensanchados ó apenas ensanchados* en la base, los de la externa denticulados ó sólo plumosos en el ápice, los de la interna plumosos.

Especie que aparece y no abundante en las montañas galai-cas, como en el Pico de Peñarrubia, Ancares, y en el monte conocido con el nombre de *Aguas Rubias* cerca de Piedrafita del Cebrero, *Lugo*. Fl. en verano. (V. vivum).

1.126 **Leontodon farinosus** Merino et Pau. (*L. graecus* Boissier Heldr., *Contr. á la Fl. de Gal.*, supl. IV, pág. 26). (Herbario núm. 1.302).

Perennis, pilis albis apice stellatis radiis circiter 8, dense undique obsitus; rhizomate crasso obliquo, fusco, squamato, multicauli; caule simplici striato, 1-3 dm. alto, erecto, parce et remote bracteolato a medio ad apicem usque sensim incrassato et fistuloso; foliis 4-10 cm. long., oblongo-linearibus, petiolatis, peciolo limbum aquante vel superante, pinnatifidis aut saepius runcinatis; involucri oblongi phyllis triseriatis, inferioribus minimis linear-lanceolatis et medis oblongis acutis, interioribus multo longioribus oblongo-linearibus obtusis vel obtusiusculis; achaeniis linearibus superne scaberrimis apice attenuatis pappo biseriato paulo brevioribus; pappi albido-rufescentis pilis externis filiformibus denticulatis, internis inferne alato-dilatatis, plumosis. Indumento *L. incano* Schrank similis, ob foliorum formam ad *L. Villarsii* Loiseleur vergens.

Vivaz, *densamente* cubierto de pelos blancos que llevan en el ápice 8 ó á veces 10 radios en forma de *estrella*; raiz corta negruzca, gruesa, oblicua y escamosa, multicaule; tallos de 1-3 decímetros de altura, erguidos, sencillos, estriados, con alguna que otra

bracteolilla remota, fistulosos y gradualmente engrosados más y más desde el medio al ápice; hojas oblongo-lineares pecioladas, siendo el pecíolo tan largo ó más que el limbo, y su longitud total de 5-10 cm., pinnatífidas ó más á menudo runcinadas; involu- cro oblongo de folíolos en 3 series, los de la serie inferior diminutos linear-lanceolados, y los de la serie media oblongos, agudos, los internos mucho más largos oblongo-lineares, obtusos ú obtusitos; aquenios de color castaño, *lineares, muy ásperos* en la mitad superior, atenuados en el ápice; vilano blanco-rojizo de pelos en 2 series, los externos filiformes, denticulados, los interiores más largos, *ancho-alados* en la base, plumosos. Por su vestidura blanca y áspero-pelosa parécese al *L. incanus* Schrank, y por la forma de las hojas runcinadas y cortas de 5-10 cm. de longitud al *L. Villarsii* Loiseleur.

Vive en las inmediaciones del bosque de La Rogueira, Courel, del lado de la aldea de Moreda, *Lugo*. Fl. en principios de verano. (V. vivum fruct.).

1.127 **Leontodon hispidus** L. (*L. proteiformis* Villars).

Vivaz, verde, de raiz más ó menos larga, oblicua, generalmente multicaule; hojas todas radicales oblongas atenuadas en la base (las primordiales con pecíolo filiforme), más ó menos revestidas de pelos *bi-trifurcados*, sinuado-dentadas ó pinnatífidas; tallo escapiforme de 1-4 dm. de longitud, sencillo, lampiño ó pelosito (con los pelos como los de las hojas), con alguna que otra bráctea ó completa-



mente *desnudo, apenas engrosado* en el ápice; folíolos del involu- cro en 2 series, los externos pequeños linear-lanceolados, aguditos, los internos linear-oblongos, obtusos; cabezuelas de flores amaril- las de 8-14 mm. de diámetro; aquenios rectos ó algo curvos, *ahusados*, adelgazados en el ápice; vilano de color parduzco tan