

- diversifolia* Ledeb. 39. Pr. caule simplici foliisque glabris, inferioribus pinnatifidis, laciniis linearibus acuminatis basi subdentatis, superioribus linearibus integerrimis, floribus subcorymbosis, anthodio scabro. *Imaus.*
- acanthifolia* W. 40. Pr. caule elato, foliis amplexicaulibus lyrato-runcinatis dentatis glabris basi lanatis, floribus fasciculatis subsessilibus. *Creta.*
- viminea* 41. Pr. caule ramofo subviscoso, foliis inferioribus runcinato-pinnatifidis, laciniis divaricatis acuminatis dentatis, summis linearibus decurrentibus, floribus lateralibus solitariis subsessilibus. *Europ. austr.*
- cymosa* * 42. Pr. radice carnosa, caule glabro superne ramofo, foliis inferioribus pinnatifidis, laciniis foliisque superioribus linearibus acuminatis integerrimis, floribus subcymosis, anthodio glabro. *Inf. Canar.* (*Chondrilla cymosa* et *pinnatifida* Poir.)
- sarmentosa* W. 43. Pr. caule filiformi prostrato, foliis radicalibus pinnatifidis, laciniis obtusis subdentatis, pedunculis 1floris squamosis. *Ind. or.*
- asplenifolia* W. 44. Pr. caulibus, foliis radicalibus pinnatifidis, laciniis oblongis obtusissimis, scapis dichotomis paucifloris. *Ind. or.*

2884. CHONDRILLA.

- juncea* 1. Ch. caule basi piloso, ramis virgatis medullosis, foliis radicalibus runcinatis hispidiusculis, superioribus lineari-lanceolatis integerrimis (subdentatis), anthodio glabriusculo. *Europ. Asia med.* (Ch. *virgata* Presl.)
- latifolia* MB. 2. Ch. caule basi piloso subramoso, foliis radicalibus runcinatis, caulinis lanceolatis, anthodio hispido. *Tauria.*
- graminea* MB. 3. Ch. caule basi laevi, foliis radicalibus subruncinatis, superioribus lineari-filiformibus, anthodio glabro. *Ad Volgam. Caucas.*
- crepioides* Syst. 4. Ch. caule simplici hispidiusculo, foliis sagittatis amplexicaulibus scabris, infimis dentatis, anthodio hispido. *Pyren. m. Lapeyrouse.*
- triquetra* Labill. 5. Ch. caule ramofo triquetro, foliis radicalibus oblongis mucronatis subdentatis, caulinis lineari-lanceolatis subfalcatis, floribus lateralibus. *Libanus.*

2885. LEONTODON.

* *Involucro reflexo.*

- Taraxacum* 1. L. squamis involucri lanceolatis acuminatis, anthodii sub apice gibbis, foliis runcinatis dentatis pilosiusculis, laciniis sangularibus. *Europ. Asia med. Amer. bor.* (*Taraxacum erythrospermum*

- Andrz., *L. corniculatus* Hornem., *beffarabicus* Fisch., *falsus* Bess. varr.)
- alpinus* Hopp. 2. *L. squamis involucri ovatis acutis, foliis runcinatis dentatis hirsutiusculis, laciniis retrorsum imbricatis Sangularibus. Alpestris Europ. med. Caucas.* (*L. caucasicus* Stev.)
- serotinus* Kit. 3. *L. squamis involucri abbreviatis linearibus squarrosis, anthodii linearibus erectis, foliis runcinatis incano - villosis, laciniis oblongis obtusis, Hungar. Transylvan. Tauria. Caucas.*

** *Involucro patulo.*

- glaucescens* MB. 4. *L. squamis involucri ovato-lanceolatis, anthodii sub apice gibbis, foliis runcinato-pinnatifidis glaucis glabris, laciniis lineari-lanceolatis subfalcatis distantibus. Ad Volgam. Caucas.*
- eriopus* Don. 5. *L. squamis involucri ovato-oblongis, foliis lineari-runcinatis glabris basi dense lanatis, scapo abbreviato lanuginoso. Emodi montes.*
- obovatus* W. 6. *L. squamis involucri ovatis acutis, foliis obovatis obtusiusculis angulato-dentatis. Hispan.*
- bulbosus* 7. *L. squamis involucri lineari-lanceolatis, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis subdentatis glabris, scapo superne glanduloso-piloso, radice repente tuberifera. Gallia austr. Italia. Afric. boreal. (Hieracium bulbosum W., Prenanthes bulbosa Cand.)*

*** *Involucro erecto f. appresso.*

- † *chinensis* Lour. 8. *L. squamis involucri acutis, anthodii subreflexis, scapo glabro, foliis obovato-oblongis apice integerrimis inferne runcinatis. China.*
- salinus* Pollin. 9. *L. squamis involucri ovatis acutis, foliis spathulato-lanceolatis s. lineari-lanceolatis deorsum dentatis scapoque glaberrimis. Europae prata subsalsa. (L. palustris Sm., lividus Kit., erectus Hofm. . . Scorzonera Taraxaci Roth., acaulis W. L. tenuifolius Hopp. var. foliis linearibus subintegerrimis.)*
- laevigatus* W. 10. *L. squamis anthodii ovatis erectis, foliis interrupte runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis ovato-lanceolatis subdentatis linearique subulatis integerrimis. Europae colles. (L. taraxacoides Hopp.)*
- Stevenii* * 11. *L. squamis involucri lanceolatis, foliis spathulatis subdentatis glabris. Caucasii cacumina. (L. alpinus Stev.)*
- Gussoni* * 12. *L. squamis involucri lineari-lanceolatis erectis, foliis lyratis glabris, laciniis rotundatis dentatis, scapo sub-2fido. Sicilia. (Crepis burifolia Guss. in lit.)*