

Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa. *Lob. ic.* 230.
Habitat Monspelii, inque Italia.

4. **LEONTODON** caule ramoso, pedunculis squamo-^{autumnale},
 sis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Fl.*
svec. 629; 695. *Meese. frist.* 329.

Crepis foliis longis dentatis linearibus, caule declinato
 nudo. *Hort. cliff.* 386.

Hieracium, chondrillæ folio glabro, radice succisa, ma-
 jus & minus. *Baub. pin.* 127.

Hieracium minus. *Fuchs. hist.* 320.

Habitat in Europæ pratis, pascuis, autumno, 24.

Pappus substipitatus plamosus.

5. **LEONTODON** scapo calyceque lœvi, foliis lan-^{hastile},
 ceolatis dentatis integerrimis glabris.

Dens leonis glaber, angustiore & longiore folio, flo-
 re minore. *Morif. hist.* 3. p. 75.

Taraxaconoides chondrillæ glabro virenti folio. *Vail.*
act. 170.

Habitat in Europa australi. ○.

Folia longa, pedalia dentibus alternis, latis, brevibus,
 glabra, vix costa hirta. Scapus indivisus, lœvis, nu-
 dus absque squamis. Calyx glaber, salcatus, basi tan-
 tum Squamis aliquot minutis anctus, ante anthesim
 mutans.

6. **LEONTODON** folijs runcinatis scabris, calyce hir-^{tuberosa},
 to. *Genan. monsp.* 411.

Taraxaconoides chondrillæ folio hirsuto, asphodeli ra-
 dice. *Vail. act.* 1721. p. 170.

Dens Leonis asphodeli bulbulis. *Baub. pin.* 126.

Chondrilla altera dioscoridis monspeliensium. *Lob. it.*
 232.

Habitat in Hetruriæ, Galloprovinciæ, Natbonæ pratis. 24.

Folia runcinata, obtusiflora; laciniis lateralibus inte-
 gris, nec denticulatis, sed curvatis versus basin.
 Scapus nūflorus, parum, Calyx vero magis hirsus.

7. **LEONTODON** calyce toto erecto, foliis dentatis hirtum:
 hirtis: pilis simplicissimis.

Crepis foliis lanceolatis dentato-sinuatis hispidis, setis su-
 bulatis, scapo unifloro. *Sp. pl.* 1. p. 799.

Hieracium, dentis leonis folio, hirsutie asperum magis
 laciniatum. *Baub. pin.* 127.